

Corynephorus Spiky Blue

Corynephorus canescens

Nombre de graines (multi-enrobées) par gramme : environ 287 (8,130 S/oz).

Production du jeune plant

Substrat

Utiliser un substrat sain et bien drainant, avec un pH de 5.5 à 6.2, et une E.C. de 0.75 mmhos/cm (extraction 1:2).

Semis

Taille des plaques :

Peut être produit en plaques de 288 alvéoles (taille européenne : 264) ou similaire. Recouvrir légèrement les graines de vermiculite.

Stade 1 – La germination prend 3 à 6 jours.

Température de germination : 20 à 26°C (68 à 79°F).

Lumière : la lumière est optionnelle.

Humidité : maintenir le substrat humide (niveau 4), pendant la germination.

Humidité de l'air : maintenir une humidité relative de 85 à 90 % jusqu'à l'émergence des cotylédons.

Stade 2

Température : 20 à 22°C (68 à 72°F).

Lumière : jusqu'à 26,900 Lux.

Humidité du substrat : réduire légèrement l'humidité (niveau 3) pour favoriser la pénétration des racines dans le substrat.

Fertilisation : appliquer une fertilisation de rang 1 (< 100 ppm N/ E.C. < 0.7 mS/cm) avec un engrais à base de nitrates et peu dosé en phosphore. Maintenir le pH du substrat entre 5.8 et 6.2 et l'E.C. entre 0.5 et 0.7 mS/cm (extraction 1:2).

Stade 3

Température du sol : 20 à 22°C (68 à 72°F).

Lumière : jusqu'à 26,900 Lux.

Humidité : le niveau d'humidité du substrat peut être réduit de moyennement à assez sec (niveau 3 à 2). Ne pas laisser les plantules flétrir.

Fertilisation : augmenter la fertilisation au niveau 2 (100 à 175 ppm d'N, EC de 0.7 à 1.2 mS/cm). Maintenir le pH du substrat entre 5.8 et 6.2 et l'E.C. entre 0.7 et 1.0 mS/cm (extraction 1:2).

Stade 4

Température : 18 à 19°C (65 à 67°F).

Lumière : jusqu'à 54,000 Lux.

Humidité : maintenir une alternance sec/humide. Ne pas laisser les plantules flétrir.

Fertilisation : maintenir la fertilisation au niveau 2 (100 à 175 ppm d'N, EC de 0.7 à 1.2 mS/cm), ainsi que le pH du substrat entre 5.8 et 6.2 et l'E.C. entre 0.7 et 1.0 mS/cm (extraction 1:2).

Régulateurs de croissance : ils ne sont pas nécessaires.

Culture de la plante finie

Substrat

Utiliser un substrat sain et bien drainant, avec un pH de 5.5 à 6.2, et une E.C. de 0.75 mmhos/cm.

Températures

Nuits : 18 à 19°C (64 à 66°F)

Jours : 19 à 23°C (66 à 74°F).

Les plantes peuvent être cultivées à des températures aussi basses que 10°C (50°F) mais la durée de culture sera significativement allongée.

Lumière

Niveau de luminosité aussi élevé que possible.

Irrigation

Cultiver les plantes sur le sec. Ne pas maintenir le substrat trop mouillé, car cela entraînerait un dépérissement ou une pourriture racinaire et un étiolement des tiges.

Fertilisation

Commencer une semaine après repiquage, en appliquant une fois par semaine une fertilisation de rang 3 (175 à 225 ppm d'N, E.C. de 1.2 à 1.5 mS/cm), avec un engrais plutôt nitrique et pauvre en phosphore.

Régulateurs de croissance : ils ne sont pas nécessaires.

Pincement

Le pincement n'est pas nécessaire.

Taille des pots

premium pack : 1 plug par alvéole

pot de 6-7 cm (2.5-in.) : 1 plug par pot

pot de 10,5 cm (4-in.) : 1 plug par pot

pot de 15 cm (6-in.) : 3 plugs (espacés) par pot

pot de 18 cm (1-gallon) : 3 plugs (espacés) par pot.

Programme de culture

Du semis au repiquage (plaques de 288/264) :
6 à 7 semaines.

Du repiquage (d'une plaque de 288) à la plante commercialisable :

Taille du pot	Nbre de plantes par pot/ suspension	Semaines après repiquage	Sem. au total
premium pack	1	6 à 7	12 à 14
Pot de 6-7 cm (2.5-in.)	1	5 à 6	11 à 13
Pot de 10-11 cm (4 à 4.5-in.)	1	6 à 7	12 à 14
Pot de 15-16 cm (6 à 6.5-in.)	3	7 à 8	13 à 15
Pot de 18 cm (Gallon)	3	7 à 8	13 à 15

Problèmes courants

Insectes : Sciarides au stade jeune plant si le substrat est maintenu trop humide.

Maladies : pourriture racinaire si culture trop humide.

NOTE : Les producteurs doivent utiliser les informations de ce document comme une indication de départ. Les temps de culture varient selon le climat, la situation, la saison et les conditions environnementales de la serre. Les recommandations en fertilisation et régulateurs de croissance sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire et de suivre les indications mentionnées sur les étiquettes des produits qu'il utilise, en accord avec la législation en vigueur.

630 231-1400
panamseed.com

© 2011 Ball Horticultural Company 12231 12/11
® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the U.S. It may also be registered in other countries.

PanAmerican Seed®