

Impatiens Jungle Gold F₁

Enfin une Impatiens Jaune!

- Hauteur: 30 à 40 cm, largeur: 30 à 40 cm
- Plante d'ombre,
En plein soleil, la floraison sera réduite, surtout lorsque la température est élevée.

I. auricoma

Nombre de graine/ gramme: 700 à 800

Germination

Substrat

Utiliser un substrat bien drainant, avec un pH de 5,5 à 6,3 et contenant un engrais de fond.

Taille de la motte

Utiliser de préférence une motte de taille moyenne.

Semis

La germination prend 6 à 8 jours et peut être faite sur les tablettes ou en chambre de germination.

Température de germination

22 à 24°C

Humidité

Maintenir une humidité maximum pendant la germination. Recouvrir légèrement le semis de vermiculite afin de maintenir un degré d'humidité élevé.

Lumière

La lumière améliore la germination.

Production de Jeunes Plants

Température

Maintenir une température de l'air de 21 à 24°C) et une température du substrat de 21°C de la germination au repotage.

Lumière

Un éclairage supplémentaire n'est pas nécessaire mais permettra de diminuer la durée de culture.

Fertilisation

Commencer la fertilisation dès l'émergence de la racelle.

Humidité du substrat

Même condition d'humidité que pour une Impatiens walleriana.

Nanifiants

L'application de nanifiant n'est pas nécessaire au stade jeune plant.

Repotage

Repotage lorsque les racines atteignent la paroi. Ne pas laisser les jeunes plants vieillir dans la plaque.

Culture de la plante finie

Taille du pot

Utiliser un pot de 11 à 15 cm de diamètre pour une plante

Température

Jours: 22 à 25°C

Nuits: 17 à 20°C

Arrosage

Maintenir une humidité du substrat moyenne. Si l'on arrose trop, la taille des feuilles sera trop importante et elles cacheront les fleurs. Si la culture est maintenue trop au sec, les feuilles risquent de jaunir et les boutons floraux peuvent avorter.

Fertilisation

Apporter une fertilisation régulière et augmenter la dose au fur et à mesure de la croissance.

Utiliser un engrais contenant l'Azote sous forme de nitrate et éviter la forme ammoniacale qui donnera des feuilles trop grandes.

Eviter les excès de salinité.

Pincement

Ce n'est pas la peine de pincer les plantes.

Pour obtenir une bonne ramification et un bon port de plante, il convient d'espacer les plantes suffisamment.

Nanifiant

Le Bonzi se révèle efficace lorsqu'il est appliqué 2 semaines après le repotage.

Il ne faut pas utiliser de nanifiant une fois que les boutons à fleurs sont apparents.

Problèmes phytosanitaires

Insectes: Thrips

Maladies: Rien de particulier à signaler.

Programme de culture

Germination: 6 à 8 jours

Culture du jeune plant: 4 à 5 semaines

Du Repotage à la floraison: 8 à 10 semaines

| Taille du pot | Plantes par Pot | Semaines de |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| | | culture partir du repotage |
| 11-cm | 1 | 8 - 9 |
| 15-cm | 1 - 2 | 9 - 10 |
| | 1 - 3 | 9 - 11 |
| 20-cm | | |

Utilisation

Placer Jungle Gold à l'ombre.

Jungle Gold peut être associée avec d'autres plantes vigoureuses.

Fertiliser régulièrement afin de maintenir une bonne couleur de feuillage et de fleurs.

PanAmerican Seed

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 www.panamseed.com

™ denotes a trademark and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the U.S. It may also be registered in other countries.

© 2003 Ball Horticultural Company Printed in USA PAS03007 REV 2/04