

## シルバーシールド™ プレクトランサス

葉の手触りはとてもソフトです

でもシルバーシールドは本当にタフな品種です

- シルバーシールド™は、葉物を集めたファンタジックフォレンジ™・シリーズ構成するユニークな1品種。シルバーグレイのやわらかい手触りの葉と、強健な株張りが特徴
- シルバーシールド™は寄せ植えの材料のほか、そのまま造園に用いると最適の品種。ストレスに強く、またとても生育活力が旺盛な植物です
- シルバーシールド™は日あたりのよい場所から、建物の間の少々陰る場所でもよく育つ品種です

本品種の学名: *P. argentatus*  
種子粒数: 1,100 粒/グラム

## 発芽ステージ

温度  
20-24°C

湿度  
相対湿度を 95%、あるいはそれ以上に維持します

光条件  
シルバーシールド™は発芽に光が必要な光好性です。光があたらないと発芽しません

播種  
覆土は不要です。発芽には 5-7 日かかります

## プラグ生産ステージ

培地の温度  
20-22°C

光条件  
照度を 30,000-54,000 ルクス(2,500-5,000 f.c.)のレベルに維持します

水分管理  
培地の水分は幼根が現れるまでは高めに維持し、発根後、根が培地内に張り出したら水分を下げ、ドライに管理します。水分を下げたら苗を枯らせないように注意しましょう

肥料  
幼根発根後に 15-0-15 を 50-75ppm(N)で開始します。子葉が展開したら、濃度を 100-150ppm(N)に上げます

矮化剤処理  
プラグ生産のステージ 3 で、B-ナインを 2,500ppm が妥当

鉢上げから出荷までのステージ  
(ポット用)培地

水はけがよく、新しく衛生的な、ピート主体の用土を用いましょう。土壌 pH は 5.5-6.2、EC 値\*は 0.75mmhos/cm が適正です

温度  
昼間温度: 21-27°C  
夜間温度: 18-20°C

光条件  
適正な温度域にあれば、照度レベルはできる限り高くします

かん水  
あまりぬらさず、乾かしぎみに管理しましょう

肥料  
週一度、200ppm(N)を与えます

矮化剤処理  
鉢上げ後 2 週で、B-ナイン 2,500ppm を与え、さらに 1 週間後にもう一度与える処理が妥当です

ピンチ  
通常ピンチは不要です

## 平均的な生産期間

播種からポット上げ(400 または 288 穴トレイ): 5-6 週  
ポット上げから開花まで: 9-10 週

コンテナサイズ  
10-12cm ポット: 1 株/ポット  
大鉢(18cm): 2 株/ポット

予想される一般的な生育障害  
通常の生育環境が維持されている限り、とくに大きな障害や病例は報告されていません

#### その他、管理と手入れについて

草 丈: 50-75cm  
株 張 り: 50-75cm  
株間間隔: 30-45cm(中心どうし)  
定植・置場: 日あたりのよい場所(いくぶん日が陰る  
ようなところでも大丈夫です)

**注意点:** EC 値(電気伝導度)は、ピート主体の北米の用土を算出の基準としているので、土を用いた配合では適合し得ない場合があります。

2005年9月改定

## PanAmerican Seed

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 [www.panamseed.com](http://www.panamseed.com)

©2004 Ball Horticultural Company Printed in USA PAS040441  
Originally issued as PAS04044 in USA, and under permission translated into  
Japanese and revised in 2005. Printed in Japan