

Spilanthes Peek-A-Boo

Une variété très attractive sur le lieu de vente!

■ Tout à fait original! Des fleurs jaunes en forme d'olive avec un œil rouge foncé portées par des tiges retombantes.

■ Feuillage vert-bronze

■ Port de plante arrondi, idéal par des compositions.

■ Hauteur: 30 à 40 cm, largeur: 60 à 75 cm.

■ Utilisable en plein soleil et en demi-ombre.

Spilanthes oleracea

4100 graines /g

Production de jeunes plants

Substrat

Utiliser un substrat bien drainant, sain avec un pH compris entre 5,5 et 6,3 et une fertilisation de fond moyenne (CE= 0.75 mmhos/cm pour un extrait 1:2).

Semis

Recouvrir le semis de vermiculite.

Température

Germination: 22 à 24°C

Développement des cotylédons: 18 à 22°C

Développement des vraies feuilles: 18 à 21°C

Finition du jeune plant: 16 à 18°C

Lumière

Germination: Un minimum de 100 lux est nécessaire pour la germination. Il est recommandé de faire germer en serre.

Après la germination: 10000 à 30000 Lux.

Développement du jeune plant: Jusqu'à 54,000 Lux si la température peut être contrôlée.

Humidité de l'air

Maintenir une humidité proche de la saturation (95% HR) jusqu'à l'émergence des cotylédons.

Humidité du substrat

Maintenir une humidité forte jusqu'à l'émergence de la radicule, puis réduire l'humidité lorsque la radicule pénètre dans le substrat.

Ne pas laisser se flétrir les jeunes plants.

Fertilisation

A partir de l'émergence de la radicule, appliquer une fertilisation de 50 à 75 ppm d'Azote avec un équilibre 15-0-15. Augmenter jusqu'à 100 à 150 ppm d'Azote à partir du déploiement des cotylédons.

Nanifiants

L'utilisation de nanifiants n'est pas nécessaire durant la culture du jeune plant.

Culture de la plante finie

Substrat

Utiliser un substrat bien drainant, sain avec un pH compris entre 5,5 et 6,5 et une fertilisation de fond moyenne.

Température

Nuits: 16 à 18°C

Jours: 18 à 24°C

Lumière

Maintenir une luminosité modérée à forte.

Arrosage

Maintenir une humidité du substrat régulière.

Ne pas laisser les plantes flétrir.

Fertilisation

Apporter chaque semaine un engrais complet à la dose de 200 ppm d'Azote.

Nanifiants

L'utilisation de Bonzi, 2 semaines après le repotage, permet de limiter l'allongement des entre-nœuds. Répéter le traitement après une semaine.

Pincement

Il est recommandé de pincer les plantes après l'apparition du quatrième niveau de feuilles en ne laissant que 2 niveaux de feuilles.

'Peek-A-Boo' a un port assez inhabituel.

La tige principale croit, se courbe et conserve sa dominance apicale jusqu'à l'apparition des premières fleurs.

Dès l'apparition des fleurs, la plante ramifiera naturellement.

Un pincement donnera une plante mieux équilibrée mais retardera la floraison d'environ 1 semaine.

Programme de culture

Production de jeunes plants: 4 à 5 semaines

Du repotage à la plante finie: 6 à 7 semaines

Taille de pot	Nombre de plantes par pot	Nombre de semaines à partir du jeune plant
Pot de 10-11 cm	1	6 à 7
Pot de 15 cm	3	6 à 7
Pot de 4 litres (20cm)	3	6 à 7

Note: Ajouter une semaine à la durée de la culture si les plantes sont pincées.

Problèmes phytosanitaires

Insectes: Attention aux attaques d'acariens, en particulier au moment de la floraison.

Maladies: Pas de problèmes spécifiques.

Pour toute information complémentaire sur cette variété ou sur les autres variétés de **PanAmerican Seed**, contactez:

Jean-François Ignasse

Tel: 04 75 41 80 85

Fax: 04 75 81 15 46

Portable: 06 80 38 77 64

Email: j-f.ignasse.panamseed@wanadoo.fr

PanAmericanSeed

© 2001 Ball Horticultural Company

JFI/ Dec 10, 2001

PanAmerican Seed Co.

622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA 60185-2698

630 231-1400 Fax: 630 231-3609 www.panamseed.com