

Stock Serie Vintage  
(Matthiola incana)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 24/02/20)

Información General

| Ubicación               | Estación de Floración | Altura                   | Extensión                | Espacio entre Plantas    |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| principios de primavera | -                     | 15-20 plg.<br>(38-51 cm) | 12-14 plg.<br>(30-36 cm) | 12-16 plg.<br>(30-41 cm) |

Germinación

| Tipo de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | días desde el 50% hasta la germinación máxima | pH/CE Inicial del sustrato (1:2) | Cubrir semilla |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| RAW             | 288                        | 1              | 4                           | 3-5                                           | 5,8-6,2 pH<br>0,75 mmhos/cm      | Sí             |

Producción de Plugs

|              | Etapla 1             | Etapla 2                                | Etapla 3                                | Etapla 4                                |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Humedad      | Nivel 4              | Nivel 3-4                               | Nivel 3-4                               | Nivel 3                                 |
| Temperatura  | 68-72°F<br>(20-22°C) | 65-68°F<br>(18-20°C)                    | 60-65°F<br>(16-18°C)                    | 55-60°F<br>(13-16°C)                    |
| Luz          | Opcional             | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 p.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| Fertilizante |                      | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7)  | 100 a 175 ppm N<br>(CE de 0,7 a 1,2)    | 100 a 175 ppm N<br>(CE de 0,7 a 1,2)    |

Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción                              | pH/CE Objetivo del sustrato (1:2) | Fertilizante                         | Horas Luz   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| (días) 60-70°F (16-21°C)<br>(noches) 50-55°F (10-13°C) | 5,8-6,2 pH<br>1,5-2,0 mmhos/cm    | 175 a 225 ppm N<br>(CE de 1,2 a 1,5) | Día Neutral |

Programación del cultivo

| Tamaño del Recipiente      | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación  | RC                          |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| Pack 306                   | 1 (ppp)         | 7-8 (semanas)     | primavera | daminozide 2.500 ppm espray |
| 4/4,5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp)         | 8-9 (semanas)     | primavera | daminozide 2.500 ppm espray |

Notas sobre Fertilizante

Una semana después del trasplante, comience un programa de fertilización continua con 150 ppm N. Mantenga la CE a 1,5 y el pH entre 5,8 y 6,2 desde el trasplante hasta el término. Enjuague el cultivo con agua pura ocasionalmente, para evitar la acumulación de sales. Nota: un programa de fertilización continua es mejor que un programa de fertilización semanal, ya que evita la clorosis de las hojas cuando el cultivo florece.

Problemas Comunes

Incorpore un programa preventivo para control de mildiu vellosa.

**NOTA:** Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

## Fotos de Variedades

---



Yellow



Mixture



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2024 Ball Horticultural Company