

Pepper (Ornamental) Red Missile

(Capsicum annuum)

Cultura para Plantas de Maceta (revisado 15/02/23)

Información General

| Ubicación               | Estación de Floración     | Altura                  | Extensión              | Espacio entre Plantas   |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| principios de primavera | verano, finales de verano | 8-10 plg.<br>(20-25 cm) | 6-8 plg.<br>(15-20 cm) | 6-10 plg.<br>(15-25 cm) |

Germinación

| Tipo de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | días desde el 50% hasta la germinación máxima | pH/CE Inicial del sustrato (1:2) | Cubrir semilla |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| RAW             | 288                        | 1              | 4-5                         | 5-7                                           | 5,8-6,2 pH<br>0,75 mmhos/cm      | No             |

Producción de Plugs

|              | Etapla 1             | Etapla 2                                | Etapla 3                                | Etapla 4                                |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Humedad      | Nivel 4              | Nivel 3-4                               | Nivel 2-4                               | Nivel 2-4                               |
| Temperatura  | 72-76°F<br>(22-24°C) | 68-73°F<br>(20-23°C)                    | 68-70°F<br>(20-21°C)                    | 68-70°F<br>(20-21°C)                    |
| Luz          | Opcional             | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 p.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| Fertilizante |                      | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7)  | 100 a 175 ppm N<br>(CE de 0,7 a 1,2)    | 100 a 175 ppm N<br>(CE de 0,7 a 1,2)    |

Recomendaciones Clave para Propagación

Se comporta mejor con mucha luz y temperaturas cálidas. Si es necesario, se puede aplicar uniconazol a una dosis de 2,5 ppm a las 2 semanas después de la siembra para controlar la altura. Repita 2 semanas más tarde si es necesario.

Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción                              | pH/CE Objetivo del sustrato (1:2) | Fertilizante                         | Horas Luz   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| (días) 68-80°F (20-27°C)<br>(noches) 65-70°F (18-21°C) | 5,5-6,2 pH<br>1,2-1,5 mmhos/cm    | 175 a 225 ppm N<br>(CE de 1,2 a 1,5) | Día Neutral |

Programación del cultivo

| Tamaño del Recipiente      | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación | RC |
|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|----|
| 4/4,5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp)         | 7-10 (semanas)    | verano   | -  |
| 5/6 plg./Galón             | 1-3 (ppp)       | 7-11 (semanas)    | verano   | -  |
| 4/4,5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp)         | 7-10 (semanas)    | otoño    | -  |
| 5/6 plg./Galón             | 1-3 (ppp)       | 7-11 (semanas)    | otoño    | -  |

Recomendaciones Clave para Terminar

Se comporta mejor con mucha luz y temperaturas cálidas. Agregue 4 a 5 semanas a los tiempos de cosecha para producción de primavera. Cultive las plantas secas para minimizar el estiramiento.

**NOTA:** Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

## Fotos de Variedades

---



Red Missile



Red Missile



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2024 Ball Horticultural Company