

Vinca Valiant™ F₁ Serisi

(*Catharanthus roseus*)

Yıllık bitki kültürü (20/02/23 tarihinde revize edilmiştir)

Viyolde bitkilendirme süresi: 5 hafta
Aktarmadan son hâle: 4-5 hafta

- Valiant serisi, Florida'da havada bulunan Phytophthora'ya karşı arazi direnci oluşturması için seçilmiştir.
- Satış noktası ve peyzajda yüksek etkili renk sergileyen, büyük çiçeklere sahip, iyi dallanmış, pazara hazır bitkiler sunar.
- Sahip olduğu üstün hibrit gücü, Valiant vinca peyzajlarının güneş, sıcaklık, kuraklık, tuz ve serin/nemli koşullar gibi çevresel streslere daha iyi dayanabilmesini sağlar.
- İyi peyzaj ömrüne sahip düşük bakım ihtiyacı.

Genel Bilgi

Etki	Çiçeklenme sezonu	Bitki Boyu	Yayılm	Ara boşluk
Güneş	İlkbahar, Geç ilkbahar, Yaz, Geç yaz, Sonbahar	14-20 in. (36-51 cm)	10-12 in. (25-30 cm)	8 in. (20 cm)

Çimlenme

Tohum formu	Tavsiye edilen viyol boyutu	Tohum/Hücre	Viyolde bitkilendirme (hafta olarak)	%50'den maksimum çimlenmeye gün sayısı	İlk yetiştirme ortamı pH/EC (1:2)	Kaplı tohum
RAW	288	1	5	3-5	5.8-6.0 pH 0.75 mmhos/cm	Evet

Fide üretimi

	Aşama 1	Aşama 2	Aşama 3	Aşama 4
Nem	Seviye 4	Seviye 3-4	Seviye 2-3	Seviye 2-4
Sıcaklık	75-78°F (24-26°C)	70-72°F (21-22°C)	70-72°F (21-22°C)	70-72°F (21-22°C)
Işık	Opsiyonel	2,500 f.c. (26,900 Lux)	2,500 f.c. (26,900 Lux)	5.000 f.c. (53.800 Lux)
Gübre		100 ppm N'tan daha az (0.7 EC'den daha az)	100 ppm N'tan daha az (0.7 EC'den daha az)	100-175 ppm N (0.7-1.2 EC)
PGR (Bitki Büyüme Düzenleyicileri)			ancymidol/2-5 ppm/Sprey	ancymidol/2-5 ppm/Sprey

Yayılm tavsiyeleri

Üretim sırasında alttan ısıtma, verim potansiyelini artırabilir ve hasat süresini kısaltabilir. Aşama 3 ve Aşama 4'te Thielaviopsis, Pythium, Phytophthora ve Rhizoctonia'ya karşı koruyucu fungusit uygulamaları önerilir. Büyüme Düzenleyicisi bilgileri, referans amaçlı verilmiştir ve tüm yetiştirme koşulları/yerleri için geçerli değildir. Kullanmadan önce ürününüzü gözden geçirin.

Büyümeden Son evreye

Büyüme sıcaklığı	Hedef yetiştirme ortamı pH/EC (1:2)	Gübre	Gün uzunluğu
(gündüz) 75 °F (24 °C) (gece) 65-68 °F (18-20 °C)	5.5-6.0 pH 1.5-2.0 mmhos/cm	225-300 ppm N (1.5-2.0 EC)	Nötr Gün

Hasat Programı

Kap boyutu	Fide/Saksı	Hasat süresi	Sezon	PGR (Bitki Büyüme Düzenleyicileri)
Hücre paket	1 (ppp)	3-4 (hafta)	İlkbahar	daminozid 2,500 ppm Sprey
4"/4.5"/Quart/10 cm	1 (ppp)	4-5 (hafta)	İlkbahar	daminozid 2,500 ppm Sprey
5"/6"/1 Gallon/15 cm	3 (ppp)	4-6 (hafta)	İlkbahar	daminozid 2,500 ppm Sprey

Gübre formülü

Aktarmadan 1 hafta sonra başlanır, ağırlıklı olarak düşük fosfor ve yüksek potasyum içeren nitrat formülü gübre kullanılarak haftada bir kez 4 oranında (225-300 ppm N/1.5-2.0 mS/cm) uygulanır. Ortam EC'sini 1,5 ila 2,0 mS/cm'de ve pH'ı 5,8'de tutun. Sabit bir gübreleme programı için gübre, yukarıda tavsiye edilen EC ve pH aralıkları korunarak 3 oranında (175 ila 225 ppm N/1,2 ila 1,5 mS/cm) uygulanabilir.

Kimyasal Hassasiyet

Bonzi, Sumagic ve Topflor ile Catharanthus roseus üzerinde fitotoksiste rapor edilmiştir.

Sık rastlanan sorunlar

Böcekler: Örümcek akarları, thrips, yaprak bitleri ve pamuklu bit. Hastalık: Rhizoctonia, Botrytis, Rhizopus, Pythium, Thielaviopsis, Alternaria, Ulocladium ve Domates Benekli Solgunluk Virüsü. Valiant, Uluslararası Tohum Federasyonu yönetmeliklerinde tanımlandığı üzere Phytophthora'ya karşı orta düzeyde dirence sahiptir.

Son evre tavsiyeleri

Aktarma sırasında fungusit ile ıslatın. Optimum üretim sıcaklıklarını korurken, ışığı mümkün olduğu kadar yüksek tutun (DLI = 12 mol·m⁻²·d⁻¹). Nem düzenini koruyun; yetişme ortamı ve yapraklarda aşırı ıslaklıktan kaçının; çünkü bu tür koşullar, hastalık oluşumuna elverişlidir. Bu seriler için bitki büyüme düzenleyicileri gerekli olmayabilir. Gün içi sıcaklığın gece sıcaklığından düşük olması bitki boyunu kontrol etmede kullanılabilir. Gerekliğinde, boy kontrolü için daminozid ve ansidol kullanılabilir.

NOT: Yetiştiriciler, burada sunulan bilgileri yalnızca kılavuz olarak kullanmalıdır. PanAmerican Seed, yetiştiricilere kendi koşullarına uygun ürün denemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir. Hasat süreleri iklime, konuma, yılın zamanına ve seranın çevre koşullarına bağlı olarak değişecektir. Uygulamanın bölgelerinde mevcut olduğunu doğrulamak ve ürünlerle ilgili tüm güncel etiket talimatlarını okuyup takip etmek yetiştiricinin sorumluluğundadır. Burada yazılan hiçbir şey, PanAmerican Seed tarafından listelenen ürünlerden herhangi birine ilişkin garanti olarak kabul edilmeyecektir. PanAmerican Seed'in satış şart ve koşulları, burada listelenen tüm ürünler için geçerlidir.

Varyete Resimleri



Apricot

Burgundy

Lilac

Magenta

Orchid

Punch

Pure White

Karşım



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ ve ®, ABD'deki Ball Horticulture Company'nin tescilli ticari bir markası olduğunu belirtmektedir. Şirket, diğer ülkelerde de kayıtlı olabilir.
©2023 Ball Horticultural Company