

Dianthus Floral Lace™ F₁ Serisi*(Dianthus chinensis x barbatus)*

Yıllık bitki kültürü (17/01/22 tarihinde revize edilmiştir)

Viyolde bitkilendirme süresi: 4-5 hafta

Aktarmadan son hâle: 4-5 hafta

- *D. chinensis x barbatus* 'un en büyük çiçeklerine sahip erken çiçeklenme– 1.5 in./4 cm'e kadar.
- Yıllık ya da iki yıllık olarak sert koşulların olduğu bahçelerde iyi performans gösterir.
- Yüksek konsantrasyona sahip ilkbahar ve Sonbahar paketi ya da küçük saksı programları için iyidir.
- Parlak yeşil yapraklı.

Genel Bilgi

Etki	Çiçeklenme sezonu	Bitki boyu	Yayılım	Ara boşluk
Güneş	Erken ilkbahar, İlkbahar, Sonbahar	8-10 in. (20-25 cm)	8 in. (20 cm)	8-10 in. (20-25 cm)

Cimlenme

Tohum formu	Tavsiye edilen viyol boyutu	Tohum/Hücre	Viyolde bitkilendirme (hafta olarak)	%50'den maksimum çimlenmeye gün sayısı	İlk yetiştirme ortamı pH/EC (1:2)	Kaplı tohum
PEL, RAW	288	1	4-6	3-5	5.8-6.2 pH 0.75 mmhos/cm	Evet

Fide üretimi

	Aşama 1	Aşama 2	Aşama 3	Aşama 4
Nem	Seviye 4	Seviye 3-4	Seviye 2-3	Seviye 2-3
Sıcaklık	64-68 °F (18-20 °C)	65-70 °F (18-21 °C)	60-65 °F (16-18 °C)	55-60 °F (13-16 °C)
Işık	Opsiyonel	5-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	8-10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Gübre		100 ppm N'tan daha az (0.7 EC'den daha az)	100-175 ppm N (0.7-1.2 EC)	175 to 225 ppm N (1,2 to 1,5 EC)
PGR (Bitki Büyüme Düzenleyicileri)		paclobutrazol/5 ppm/Sprey	paclobutrazol/5 ppm/Sprey	

Büyümeden Son evreye

Büyüme sıcaklığı	Hedef yetiştirme ortamı pH/EC (1:2)	Gübre	Gün uzunluğu
(gündüz) 60-72 °F (16-22 °C)	5.8-6.2 pH 1.5-2.0 mmhos/cm	175 to 225 ppm N (1,2 to 1,5 EC)	Fakültatif uzun gün

Hasat Programı

Kap boyutu	Fide/Saksı	Hasat süresi	Sezon	PGR (Bitki Büyüme Düzenleyicileri)
Hücre paket	1 (ppp)	8-10 (hafta)	Geç ilkbahar	Paclobutrazol 15-20 ppm Sprey
4"/4.5"/Quart/10 cm	1 (ppp)	8-10 (hafta)	Geç ilkbahar	Paclobutrazol 15-20 ppm Sprey

Gübre formülü

150-200 ppm azotla 15-0-15 ile her iki sulamada gübreleyin.

Sık rastlanan sorunlar

Böcekler: Yaprak biti, Thrips hastalıkları: Alternaria, Pas

Son evre tavsiyeleri

Boy, gübre kısıtlaması ile -özellikle fosfor ve amonyum formlu azot- kontrol edilebilir. Dianthus, gündüz/gece sıcaklık farkına (DIF) duyarlıdır ve negatif DIF'te daha kısadır.

NOT: Yetiştiriciler, burada sunulan bilgileri yalnızca kılavuz olarak kullanmalıdır. PanAmerican Seed, yetiştiricilere kendi koşullarına uygun ürün denemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir. Hasat süreleri iklime, konuma, yılın zamanına ve seranın çevre koşullarına bağlı olarak değişecektir. Uygulamanın bölgelerinde mevcut olduğunu doğrulamak ve ürünlerle ilgili tüm güncel etiket talimatlarını okuyup takip etmek yetiştiricinin sorumluluğundadır. Burada yazılan hiçbir şey, PanAmerican Seed tarafından listelenen ürünlerden herhangi birine ilişkin garanti olarak kabul edilmeyecektir. PanAmerican Seed'in satış şart ve koşulları, burada listelenen tüm ürünler için geçerlidir.

Varyete Resimleri



Cherry



Crimson




Lilac




Picotee



Purple



Red



True Rose



Violet Picotee



White



Karışım



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ ve ©, ABD'deki Ball Horticulture Company'nin tescilli ticari bir markası olduğunu belirtmektedir. Şirket, diğer ülkelerde de kayıtlı olabilir.
©2023 Ball Horticultural Company