

## Impatiens Beacon® F<sub>1</sub> Serisi

(*Impatiens walleriana*)

Yıllık bitki kültürü (15/02/23 tarihinde revize edilmiştir)

### YENİ deniz feneri karışımlarıyla gölgede daha parlak renkler

Impatiens mildiyö hastalığının ciddi olduğu yerlerde adını tanınmış deniz fenerlerinden alan **3 YENİ Beacon karışım rengini** pazara tanıtıyoruz. Bu bitkiler, gölgede **birlikte iyi büyüme gösterip** canlı görünmek için test edilmiş ve onaylanmıştır. Impatiens mildiyö nedeniyle görülen yaygın *Plasmopara destructor* popülasyonlarına karşı **yüksek direnç** sunar. Üç karışım da paket, saksı, makrome saksı ve toprak yatakları için uygundur.

Beacon Impatiens her yıl satışının belli bir yüzdesini **farklı yardım kurumlarını destekleyerek** az bilinen hastalıklara "ışık tutma" konusunda yardımcı olmaya devam edecektir. Daha fazla ayrıntı için [beaconimpatiens.com](http://beaconimpatiens.com) sayfasını ziyaret edin.

**Viyolde bitkilendirme süresi:** 4-5 hafta

**Aktarmadan son hâle:** 4-5 hafta

- Beacon impatiens, Impatiens mildiyö (İM) hastalığının neden olduğu yaygın *Plasmopara destructor* popülasyonlarına yüksek direnç gösterir.
- Beacon impatiens, satışları artırmak için iyi bilinen, talep gören, yetiştirilmesi kolay ve çok yönlü bir ürünü üretime geri kazandırma fırsatı sunmaktadır.
- Kapsamlı denemeler, Beacon impatiens'in İM'ye karşı genetik olarak yüksek direnç sunduğunu kanıtlamıştır. Beacon'un İM'ye karşı bağımsızlığı yoktur; ancak önleyici İM fungusitlerinin tavsiye edilebileceği senaryolar bulunmaktadır.
- Beacon impatiens'in üretim planlamasına dahil edilmesi kolaydır.
- Bahçe ve peyzaj alanları için hızlı doluluk ve sezon boyu renk.

## Genel Bilgi

Etki	Çiçeklenme sezonu	Bitki boyu	Yayılım	Ara boşluk
Gölge, Kısmi güneş	İlkbahar, Geç ilkbahar, Yaz, Geç yaz	14-18 in. (36-46 cm)	12-14 in. (30-36 cm)	8-10 in. (20-25 cm)

## Çimlenme

Tohum formu	Tavsiye edilen viyol boyutu	Tohum/Hücre	Viyolde bitkilendirme (hafta olarak)	%50'den maksimum çimlenmeye gün sayısı	İlk yetiştirme ortamı pH/EC (1:2)	Kaplı tohum
COT	288	1	4-5	3-6	6.0-6.2 pH 0.5-0.75 mmhos/cm	Hayır

## Fide üretimi

	Aşama 1	Aşama 2	Aşama 3	Aşama 4
Nem	Seviye 4-5	Seviye 2-4	Seviye 2-3	Seviye 2-3
Sıcaklık	68-77 °F (20-25 °C)	64-73 °F (18-23 °C)	65-68 °F (18-20 °C)	62-65 °F (17-18 °C)
Işık	Işık	450-700 f.c. (4,800-7,500 Lux)	450-700 f.c. (4,800-7,500 Lux)	450-700 f.c. (4,800-7,500 Lux)
Gübre		100 ppm N'tan daha az (0.7 EC'den daha az)	100 ppm N'tan daha az (0.7 EC'den daha az)	100 ppm N'tan daha az (0.7 EC'den daha az)

## Yayılım tavsiyeleri

Tohumu örtmeyin. Beacon White, 1. ve 2. aşamalarda diğer Beacon renklerinden biraz daha yavaştır.

## Büyümeden Son evreye

Büyüme sıcaklığı	Hedef yetiştirme ortamı pH/EC (1:2)	Gübre	Gün uzunluğu
(gündüz) 70-75 °F (21-24 °C) (gece) 62-68 °F (17-20 °C)	6.2-6.5 pH 0.75-1.0 mmhos/cm	100 ppm N'tan daha az (0.7 EC'den daha az)	Gün, uzunluğundan etkilenmeyen

## Hasat Programı

Kap boyutu	Fide/Saksı	Hasat süresi	Sezon	PGR (Bitki Büyüme Düzenleyicileri)
Hücre Paketi	1 (ppp)	3-4 (hafta)	İlkbahar	-
4"/4.5"/Quart/10 cm	1 (ppp)	4-5 (hafta)	İlkbahar	-
10" Saksı ya da HB/3 Gallon/25 cm	3-5 (ppp)	8-10 (hafta)	İlkbahar	-

### Son evre tavsiyeleri

Impatiens daminozid, paclobutrazol ve uniconazol'e tepki verecektir. Sulama ve gübrelemenin izlenmesi, bitki büyümesi ile canlılığının kontrol edilmesinde yardımcı olabilir.

NOT: Yetiştiriciler, burada sunulan bilgileri yalnızca kılavuz olarak kullanmalıdır. PanAmerican Seed, yetiştiricilere kendi koşullarına uygun ürün denemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir. Hasat süreleri iklime, konuma, yılın zamanına ve seranın çevre koşullarına bağlı olarak değişecektir. Uygulamanın bölgelerinde mevcut olduğunu doğrulamak ve ürünlerle ilgili tüm güncel etiket talimatlarını okuyup takip etmek yetiştiricinin sorumluluğundadır. Burada yazılan hiçbir şey, PanAmerican Seed tarafından listelenen ürünlerden herhangi birine ilişkin garanti olarak kabul edilmeyecektir. PanAmerican Seed'in satış şart ve koşulları, burada listelenen tüm ürünler için geçerlidir.

## Varyete Resimleri



Bright Red

Coral

Lipstick

Orange


Rose

Salmon

Violet Shades

White

Cape Pine  
Mixture



Formula  
Mixture  
Improved

Lindau Mixture  
Pearl Island  
Mixture

Portland  
Mixture

Sanibel Mixture



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ ve ©, ABD'deki Ball Horticulture Company'nin tescilli ticari bir markası olduğunu belirtmektedir. Şirket, diğer ülkelerde de kayıtlı olabilir.  
©2023 Ball Horticultural Company