

グロウファクト

パンアメリカン・シード品種栽培指針

PanAmericanSeed

バジル (ハーブ) エバーリーフ ジェノベーゼ

Herb (Basil) Everleaf Genovese

(*Ocimum basilicum*)

2017年4月更新

鉢上げから収穫まで: 30~45日

プラグ生産期間: 4~5週

鉢上げから出荷まで: 3~8週

- ・ 長期にわたって連続収穫できる初めてのバジル品種。
- ・ コンパクトで分枝に優れ、節間長も短い品種。分枝の多さにより円柱状のまとまりの良い草型が圃場でも鉢植えでも維持される。
- ・ 芳醇なジェノベーゼ風味でペストやソースに追加する料理に最適。
- ・ ベト病に半耐性があり、標準的なフザリウム耐性により、いかなる圃場でも栽培が可能。

基本情報

日照環境	開花期間	草丈	草幅	植栽間隔
直射日光下	晩夏	46- 61cm	30 - 46cm	15 - 46 cm

発芽環境

種子形態	推奨プラグサイズ	1セルあたりの播種数量	プラグ生産期間(週)	発芽日数(日)	用土pH/EC値	覆土
ロウシード	406	1-3	4-5	2-4	5.5-5.8 pH 0.75 mmhos/cm	必要

プラグ生産

	ステージ 1	ステージ 2	ステージ 3	ステージ 4
水分量	レベル 4	レベル 3-4	レベル 2-3	レベル 2-3
温度環境	20-23°C	18-21°C	18-21°C	17-18°C
光環境	オプショナル	1,000-2,500 f.c. (10,800-26,900 Lux)	1,000-2,500 f.c. (10,800-26,900 Lux)	2,500-5,000 f.c. (26,900-53,800 Lux)
施肥	100 ppm N以下 - 0.7 EC以下	100 ppm N以下 - 0.7 EC以下	100 ppm N以下 - 0.7以下	100 ~175 ppm N - 0.7~1.2 EC

生産のポイント

最終出荷形態鉢に直播きも可能。

鉢上げから出荷まで

生産温度環境	用土pH/EC値 管理目標値	施肥量及びEC値	日長反応
日中温度: 18-21°C 夜間温度: 17-18°C	5.5-6.2 pH 1.0 mmhos/cm	100~175 ppm N - 0.7- 1.2 EC	

栽培期間

鉢サイズ	ポットあたりの プラグ定植数	栽培期間 (週)	シーズン
カットパック	1 (ppp)	3-4 (週)	春
10.5cmポット	1 (ppp)	3-4 (週)	春
12~15cmポット	1 (ppp)	4-5 (週)	春

出荷時におけるキーポイント

定植からおよそ30~45日で収穫可能。

品種写真



エバーリーフ ジェノベーゼ

【注意点】

本グロワーファクトのご利用にあたっては、ここで提示している栽培情報は基本的な指標としてご活用下さい。栽培期間などは生産地の立地条件や作型、また施設などの個々の環境や条件によって異なります。また、殺菌・殺虫薬剤や生長制御処理剤の処理方法については栽培される当該国や地域の法令や規則を遵守し、注意書きや使用方法に従って正しくご利用下さい。

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA.
60185-2698 630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

[®] denotes a trademark of and [®] denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.

©2017 Ball Horticultural Company