

## **ColorGrass Corynephorus Spiky Blue**

*(Corynephorus canescens)*

**Germinazione:** numero di semi circa (semi mutipli in pillola): 287 Semi/gr

**Substrato:** usare un substrato ben drenante, esente da patogeni, con un pH di 5.5 a 6.2 e l' EC di circa 0.75 mS/cm (2:1 estratto secco).

### **Semina**

#### **Misura dell'alveolo dei contenitori:**

Si può produrre in contenitori alveolari da 288 alveoli (misura europea: 264) o contenitori alveolari dalle dimensioni simili. Coprire leggermente i semi con vermiculite.

**Stadio 1** – La germinazione prende da 3 a 6 giorni.

**Temperatura di germinazione:** da 20 a 26 °C

**Luce:** la luce è facoltativa.

**Umidità del substrato:** mantenere il substrato, durante la germinazione, medio bagnato (livello 4)

**Umidità relativa:** mantenere l'umidità relativa da 85 al 90% fino al dispiegamento dei cotiledoni

### **Produzione di piantine in contenitori alveolari**

#### **Stadio 2**

**Temperatura:** da 20 a 22 °C

**Luce:** può essere superiore ai 26.900 Lux

**Umidità del substrato:** iniziare a ridurre leggermente l'umidità dal substrato (livello 3), per permettere alle radici di penetrare nel substrato.

**Fertilizzante:** dare fertilizzante alla dose 1 (meno di 100 ppm /meno di 9.7 mS/cm EC) con un concime a forma nitrica con basso contenuto in fosforo. Mantenere il pH del substrato da 5.8 a 6.2 e EC a 0,5 a 0,7 mS/cm (1:2 estratto).

#### **Stadio 3**

**Temperatura:** da 20 a 22 °C

**Luce:** può essere superiore ai 26.900 Lux

**Umidità del substrato:** l'umidità del substrato potrà essere ridotta da media a asciutto (livelli 3 – 2 ). Non lasciare avvizzire le piantine.

**Fertilizzante:** aumentare, la concimazione al livello 2 (100 a 175 ppm N/ 0.7 a 1.2 mS/cm EC). Mantenere il pH del substrato da 5.8 a 6.2 e l'EC da 0.7 a 1.0 mS/cm (1:2 estratto).

## **Stadio 4**

**Temperatura:** da 18 a 19°C

**Luce:** può essere superiore ai 54.000 Lux

**Umidità del substrato:** mantenere il ciclo asciutto/bagnato Non lasciare avvizzire le piantine.

**Fertilizzante:** aumentare la concimazione al livello 2 (100 to 175 ppm N/ 0.7 a 1.2 mS/cm EC). Mantenere il pH del substrato da 5.8 a 6.2 e l'EC da 0.7 a 1.0 mS/cm (1:2 estratto).

**Brachizzanti:** non necessari.

## **Coltivazione fino alla pianta finita**

**Substrato:** usare un substrato ben drenante, esente da patogeni, a base di torba, con un pH di 5.5 a 6,2 e l' EC di circa 0,75 mS/cm.

**Temperatura:** di Notte da 18 a 19°C, di giorno da 19 a 23 °C

Le piante si possono coltivare anche a temperature inferiori dei 50°, ma il tempo di coltivazione aumenta sensibilmente.

**Luce:** la più alta possibile.

## **Bagnatura.**

Coltivare in luoghi asciutti Non mantenere il substrato bagnato poiché può causare marciume alle radici o steli magri e deboli.

**Fertilizzante:** iniziare una settimana dopo il trapianto, dare fertilizzante alla dose 3 (175 a 225 ppm N/1.2 a 1.5 mS/cm) una volta alla settimana

Con un conzime a base nitrica con basso contenuto di fosforo.

**Brachizzanti:** non necessari.

**Spuntatura:** non è richiesta.

## **Misura del vaso**

**Pack da 306 alveoli:** 1 zolletta

**Vaso da 6 cm:** 1 zolletta

**Vaso da 10 cm:** 1 zolletta

**Vaso da 15 cm:** 3 zollette

**Vaso da 18 cm:** 3 zollette (allargate)

## **Programma di coltivazione**

**Tempo dalla semina al trapianto di zollette da contenitori alveolari da 288/264 alveoli:** da 6 a 7 settimane

**Dal trapianto alla pianta vendibile (partendo da zollette in contenitori da 288 alveoli):**

**Misura del vaso:** Pack da 306 alveoli:

**Piante per vaso/Basket:** 1 zolletta

**Settimane dal trapianto:** 6 a 7

**Settimane totali:** 12 a 14

**Misura del vaso:** vasi da 6 cm

**Piante per vaso/basket:** 1 zolletta

**Settimane dal trapianto:** 5 a 6

**Settimane totali:** 11 a 13

**Misura del vaso:** da 10 a 11 cm

**Piante per vaso:** 1 zolletta

**Settimane dal trapianto:** 6 a 7

**Settimane totali:** 12 a 14

**Misura del vaso:** 15 a 16 cm

**Piante per vaso/Basket:** 3 zollette

**Settimane dal trapianto:** 7 a 8

**Settimane totali:** da 13 a 15

**Misura del vaso:** 18 cm

**Piante per vaso/Basket:** 3 zollette

**Settimane dal trapianto:** 7 a 8

**Settimane totali:** da 13 a 15

**Problemi comuni:**

**Insetti:** sciaridi allo stadio della coltivazione in contenitore o nello stadio di giovane piantina quando il vaso è mantenuto troppo bagnato.

**Malattie fungine:** si avrà marciume radicale quando si coltiva troppo bagnato.

**ANNOTAZIONE:** *i coltivatori dovranno usare queste informazioni come punto di partenza. Il periodo di coltivazione potrà variare secondo del clima, ubicazione, periodo dell'anno, e dalle condizioni ambientali della serra. I consigli sulle applicazioni dei brachizzanti sono solo indicative. E' responsabilità dell'utilizzatore, leggere e seguire tutte le ordinarie informazioni contenute sull'etichetta di ogni prodotto, che deve essere usato in conformità di tutti regolamenti.*