

グロワーファクト

パンアメリカン・シード品種栽培指針

PanAmericanSeed®

ダイアンサス F₁コロナ シリーズ

Dianthus Corona Series F₁

Dianthus chinensis

2019年5月新規作成

花色数が多く5~8cm程の巨大輪を着けるシネンシス種の新シリーズ

プラグ生産期間 (288穴) : 4~6週

鉢上げから出荷まで: 6~8週 (栽培する環境の日長、光環境、温度条件による。)

- 競合同系品種に比べてより大輪で開花の揃いがよいシリーズ。
- マウンド型のコンパクトな草姿に多くの花を株の上につける。

基本情報

日照環境	開花期間	草丈	草幅	植栽間隔
直射日光下	早春から晩春、秋季	20-25cm	20-25cm	20-25cm

発芽環境

種子形態	推奨プラグサイズ	1セルあたりの播種数量	プラグ生産期間(週)	発芽日数(日)	用土pH/EC値	覆土
ペレット種子	288	1	4-6	3-5	5.8-6.2 pH	要
					0.75 mmhos/cm	
					0.7-1.2EC	

プラグ生産

	ステージ 1	ステージ 2	ステージ 3	ステージ 4
水分量	レベル 4	レベル 3-4	レベル 2-3	レベル 2-3
温度環境	18-20°C	18-21°C	16-18°C	13-16°C
光環境	弱光	5-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	8-10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
施肥			100 - 175 ppm N 0.7 - 1.2 EC	100 - 175 ppm N 0.7 - 1.2 EC

鉢上げから出荷まで

生育温度	用土 pH・EC値 管理目標	施肥量	日長反応
日中温度：16-22℃ 夜間温度：10-16℃	5.8-6.2pH 1.5-2.0mmhos/cm	175-225 ppm N 1.2-1.5EC	長日植物


栽培期間

鉢サイズ	ポットあたりの プラグ定植数	栽培期間 (週)	シーズン
カットバック	1 (ppp)	6 - 8 (週)	晩春
10.5cmポット	1-3 (ppp)	6 - 8 (週)	晩春

出荷時におけるキーポイント

- 強光下でさらに夜温が低い環境で最も良い状態の苗が仕上がる。
- 弱光下では栽培期間がより長くなる。

品種写真



チェリーレッド

ローズ

ストロベリー

ホワイト

ミックス

【注意点】

本グロウファクトのご利用にあたっては、ここで提示している栽培情報は基本的な指標としてご活用下さい。栽培期間などは生産地の立地条件や作型、また施設などの個々の環境や条件によって異なります。また、殺菌・殺虫薬剤や生長制御処理剤の処理方法については栽培される当該国や地域の法令や規則を遵守し、注意書きや使用方法に従って正しくご利用下さい。

PanAmerican Seed Co.

622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA.

60185-2698 630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.

©2018 Ball Horticultural Company