

グロワーファクト

パンアメリカン・シード品種栽培指針

PanAmericanSeed®

這い性ダブル ペチュニア F₁ダブルカスケードウェーブ シリーズ Petunia Double Double Cascade F₁ Series

(Petunia x hybrida)

2019年5月新規作成

大きな8~9cmのまるでカーネーションのような重ねの多い八重咲のペチュニアシリーズ

プラグ生産期間 (288穴) : 4-5週
鉢上げから出荷まで: 6~7週 (栽培する環境の日長、光環境、温度条件による。)

基本情報

日照環境	開花期間	草丈	草幅	植栽間隔
直射日光下	春から晩秋	25-38 cm	25-30 cm	25-36 cm

発芽環境

種子形態	推奨プラグサイズ	1セルあたりの播種数量	プラグ生産期間(週)	発芽日数(日)	用土 pH/EC値	覆土
ペレット種子	288	1	4-5	3-5	5.5-5.8 pH 0.75mmhos/cm	不要

プラグ生産

	ステージ 1	ステージ 2	ステージ 3	ステージ 4
水分量	レベル 4	レベル 3-4	レベル 2-4	レベル 2-4
温度環境	22-24°C	20-24°C	18-21°C	16-18°C
光環境	弱光	450-700 f.c. (4,800-7,500 Lux)	450-700 f.c. (4,800-7,500 Lux)	450-700 f.c. (4,800-7,500 Lux)
施肥	100ppm N以下 - 0.7 EC以下	100ppm N以下 - 0.7 EC以下	100-175ppm N 0.7-1.2EC以下	100-175ppm N 0.7-1.2EC以下

鉢上げから出荷まで

生育温度	用土 pH・EC値 管理目標	施肥量	日長反応
日中温度：18-22℃ 夜間温度：16-17℃	5.8-6.3pH 1.5-2.0mmhos/cm	100-175ppm N 0.7-1.2EC	長日植物

栽培期間

鉢サイズ	ポットあたりの プラグ定植数	栽培期間 (週)	シーズン
306カットパック	-	-	-
10.5cmポット	1 (ppp)	6 - 7 (週)	春
21cm鉢以上	3 (ppp)	8 - 9 (週)	春

出荷時におけるキーポイント

- 害虫としてスリップス、アブラムシ、キノコバエが発生しやすく予防と防除を徹底する。
- 病害としてボトリティス、リゾクトニア、ピシウムに注意する。
- 矮化剤は環境に応じて鉢上げ後7~10日後に施用する。
- 最低温度10℃でも栽培可能だが、栽培期間は長期化する。

品種写真



ブルー

バーガンディ

オーキッドミスト

ピンク

ヴァレンタイン

ミックス

2020年度にラベンダースカイブルーが新品種として加わりました。

【注意点】

本グロウファクトのご利用にあたっては、ここで提示している栽培情報は基本的な指標としてご活用下さい。栽培期間などは生産地の立地条件や作型、また施設などの個々の環境や条件によって異なります。また、殺菌・殺虫薬剤や生長制御処理剤の処理方法については栽培される当該国や地域の法令や規則を遵守し、注意書きや使用方法に従って正しくご利用下さい。

PanAmerican Seed Co.

622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA.

60185-2698 630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.

©2018 Ball Horticultural Company