

Impatiens Jungle Gold F1

Finalmente un Impatiens gialla!

- Altezza: da 30 a 40 cm,
- larghezza : da 30 a 40 cm
- Pianta da ombra

In pieno sole la fioritura sarà ridotta, soprattutto in presenza di temperature elevate.

I. auricoma

Numero di semi per grammo: da 700 a 800

Germinazione:

Substrato

Utilizzare un substrato concimato, drenante con un pH compreso tra 5,5 e 6,3.

Dimensione della zolla

Utilizzare preferibilmente zolle di taglia media.

Semina

La germinazione impiega dai 6 agli 8 giorni e può essere eseguita sui bancali o in cella di germinazione.

Temperatura di germinazione:

da 22 a 24°C

Umidità

Durante la germinazione mantenere la massima umidità possibile. Ricoprire leggermente i semi con vermiculite allo scopo di favorire il mantenimento di un elevato grado di umidità.

Illuminazione

La luce migliora la germinazione.

Produzione delle piantine

Temperatura

Mantenere una temperatura dell'aria di circa 21° - 24°C ed una temperatura del substrato di 21°C dalla germinazione al rinvaso.

Illuminazione

L'illuminazione supplementare non è necessaria ma consentirà, se fornita, di accorciare i tempi di coltivazione.

Concimazione

Iniziare a concimare dalla comparsa della radice secondaria.

Umidità del substrato

Stesse condizioni di umidità di una Impatiens walleriana.

Brachizzanti

L'uso di brachizzanti non è necessario allo stadio di giovane piantina.

Invasatura:

Invasare non appena le radici raggiungono la parete del vaso. Non lasciar invecchiare le piantine nel contenitore alveolare.

Coltivazione della pianta finita

Dimensione del vaso

Utilizzare un vaso di 11 – 15 cm di diametro con una piantina per vaso

Temperatura

diurna: da 22° a 25°C

Notturna: da 17° a 20°C

Anaffiatura

Mantenere un'umidità del substrato media. In caso di eccessiva annaffiatura la dimensione delle foglie sarà eccessiva e queste finiranno per nascondere i fiori. Mantenendo la coltura troppo secca, le foglie rischiano di ingiallire ed i boccioli rischiano di abortire.

Concimazione

Concimare regolarmente ed aumentare la dose in base alla crescita. Utilizzare un concime contenente Azoto sotto forma di nitrato ed evitare la forma ammoniacale che produrrà foglie troppo grandi. Evitare l'eccessiva salinità.

Cimatura

Non vale la pena di cimare le piante. Per ottenere una buona ramificazione ed un buon portamento conviene spaziare le piante sufficientemente

Nanizzanti

Il Bonzi si rivela efficace se somministrato 2 settimane dopo il rinvaso. Non utilizzare brachizzanti una volta comparsi i bottoni fiorali.

Dim del vaso	Piante per vaso	Settimane di coltivazione da invasatura
11 cm	1	8-9
15 cm	1 - 2	9 - 10
20 cm	1 - 3	9 - 11

Problemi fitosanitari

Insetti: Tripidi

Patologie: Non si conosce alcuna particolare vulnerabilità.

Programmazione della coltura:

Germinazione: da 6 a 8 giorni

Produzione della giovane piantina : da 4 a 5 settimane

Dal trapianto alla fioritura : da 8 a 10 settimane

Impiego:

Posizionare Jungle Gold in un luogo ombreggiato.

Jungle Gold si può abbinare ad altre piante vigorose.

Concimare regolarmente per mantenere un bel colore della foglia e dei fiori.

PanAmerican Seed™

PanAmSeed.com

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road
West Chicago, Illinois USA 60185-2698
630 231-1400
Fax: 630 231-3609

PanAmerican Seed Europe BV
Lavendelweg 10
NL-1435 EW Rijsenhout, Holland
+31 (0)297-383038
Fax: +31 (0)297-383036