

## Iresine Purple Lady

*Iresine à feuillage violet foncé, disponible pour la première fois à partir de graines!*

- Plante basse, très couvrante et retombante.
- Idéale pour les compositions ou tout simplement en suspension.
- 'Purple Lady' est également un excellent couvre-sol quand il est planté dans un massif.
- Plante pour emplacement ombragé ou demi-ombragé.
- Hauteur de 15 à 20 cm dans le jardin et jusqu'à 1m de large.

*Iresine herbstii*

1,580 graines/g

### Production de Jeunes Plants

#### Substrat

Utiliser un substrat bien drainant avec un pH compris entre 5,5 et 6,3 et une CE de 0,75.

#### Semis

Recouvrir légèrement les graines de vermiculite.

#### Température

**Germination:** 22 à 24°C

**Stade Cotylédons :** 18 à 22°C

**Stade Vraies Feuilles:** 18 à 21°C

**Finition des jeunes plants:** 16 à 18°C

#### Lumière

**Stade 1:** La lumière permet d'accélérer la germination.

**Après la germination:** 10000 à 30000 Lux.

**Finition:** Jusqu'à 54000 Lux

#### Humidité

Maintenir une humidité relative de 95% jusqu'à l'émergence des cotylédons.

#### Humidité du substrat

Maintenir une humidité forte jusqu'à l'émergence de la radicule puis, réduire l'humidité lorsque la radicule pénètre dans le substrat.

Ne pas laisser la jeune plante flétrir.

#### Fertilisation

Commencer la fertilisation dès l'émergence de la radicule et augmenter lorsque les cotylédons s'étalent.

#### Régulateurs de Croissance

Pas nécessaires au stade jeunes plants

#### Culture de la plante finie

##### Substrat

Utiliser un substrat bien drainant, enrichi, avec un pH de 5,5 à 6,5

##### Température

**Nuits:** 16 à 18°C

**Jours:** 18 à 24°C

##### Lumière

Une lumière faible donnera un feuillage vert-bronze alors qu'une lumière forte donnera un feuillage violet foncé.

##### Arrosage

Ne pas tenir le substrat trop humide.

##### Fertilisation

Fertiliser régulièrement avec un engrais complet. Une fertilisation forte donnera une croissance rapide. Un feuillage rouge indique une plante mal nourrie.

##### Régulateurs de croissance

Il n'est, en général, pas nécessaire d'utiliser des régulateurs de croissance. Au besoin, on peut réduire la fertilisation ou les arrosages pour diminuer la croissance.

##### Pincement

Il n'est pas nécessaire de pincer.

## Programme de culture

**Du semis au repotage:** environ 4 semaines

**Du repotage à la plante finie ( pot de 10-cm):**

5 à 6 semaines

Taille du pot	Plantes par Pot	Semaines du repotage à la plante finie
Pot de 10 à 11-cm	1	5 à 6
Suspension de 30 à 35-cm	4 à 5	6 à 7

## Problèmes courants

**Insectes:** Faire attention aux pucerons

**Maladies:** Pas de problèmes particuliers

# PanAmerican Seed

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 [www.panamseed.com](http://www.panamseed.com)