

Bacopa Blutopia® F₁

(*Sutera cordata*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

Plug crop time: 3 to 4 weeks

Transplant to finish: 4 to 6 weeks

- First-ever bacopas from seed let you fully mechanize production, with easy crop scheduling and quick turns with no pinch.
- Economical for accent plant programs.
- Perform well in large planters and mixed containers.

Algemene informatie

| Blootstelling | Bloeiperiode | Hoogte | Breedte | Plantafstand |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| Half schaduw, Zon | Vroege voorjaar, Voorjaar, Najaar | 6 in. (15 cm) | 18-24 in. (46-61 cm) | 8-20 in. (20-51 cm) |

Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Het aantal dagen tot de kieming | pH- en EC-waarden zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| MPL | 288 128 | 1 1 | 3-4 4 | 4 | 5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm | Nee |

Pluggenteelt

| | Ontwikkelingsstadium 1 | Ontwikkelingsstadium 2 | Ontwikkelingsstadium 3 | Ontwikkelingsstadium 4 |
|------------------------------|--|---|---|---|
| Vochtigheid substraat | Niveau 4 | Niveau 3-4 | Niveau 3-4 | Niveau 3 |
| Temperatuur | 68-74°F 20-23°C | 65-75°F 18-24°C | 65-75°F 18-24°C | 60-70°F 16-21°C |
| Licht | Licht | 1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux) |
| Bemesten | Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7 | Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7 | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2 | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2 |
| Groeiregulators | | | | daminozide/640-950 ppm/Spuiten |

Bemestingsaanbeveling

Maak gebruik van een stikstofmeststof met een laag fosforgehalte.

Belangrijke tips voor vermeerdering

Toepassing van groeiregulators of een teelt buiten leidt tot een veel evenwichtiger opbouw van de planten Geef voldoende water aan pellets met meerdere zaden en belicht voor een optimale kieming.

Teelt tot eindproduct

| Teelttemperatuur | pH- en EC-waarden teeltsubstraat | Bemesten | Daglengte |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (dag) 60-75°F16-24°C (nacht) 55-60°F13-16°C | 5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm | 225 tot 300 ml N - EC 1,5 tot 2,0 | Daglengteneutraal |

Teeltplanning

| Potmaat / Containermaat | Planten per pot | Teeltduur | Seizoen | Groeiregulators |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------------------|
| 4"/4.5"/Quart | 1 (ppp) | 4-6 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500 ppm Spuiten |
| 10" Pot of HB/3 Gallon | 5-6 (ppp) | 8-9 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500 ppm Spuiten |

Bemestingsaanbeveling

Maak bij voorkeur gebruik van een stikstofmeststof met een laag fosforgehalte. Wissel indien nodig af met een mengmeststof op basis van ammonium en stikstof om de groei te bevorderen en voor een evenwichtige pH.

Ziekten en plagen


Insecten: Witte vliegen

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Toepassing van groeiregulators of een teelt buiten leidt tot een veel evenwichtiger opbouw van de planten. Geef voldoende water aan pellets met meerdere zaden en belicht voor een optimale kieming. Voorkom uitersten zoals erg nat of erg droog. Laat planten niet verwelken aangezien dit leidt tot knop- en bloemval.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.


Foto's ras



Blutopia



Blutopia



Blutopia



Blutopia

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company