

## Bacopa Pinktopia F<sub>1</sub>

(*Sutera cordata*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 17-01-19)

### Algemene informatie

| Blootstelling     | Bloeiperiode              | Hoogte           | Breedte                 | Plantafstand           |
|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| Half schaduw, Zon | Vroege voorjaar, Voorjaar | 6 in.<br>(15 cm) | 18-24 in.<br>(46-61 cm) | 8-20 in.<br>(20-51 cm) |

### Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Het aantal dagen tot de kieming | pH- en EC-waarden zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| MPL             | 288<br>128          | 1<br>1     | 3-4<br>4                     | 4                               | 55,0-60,0 pH<br>0,75 mmhos/cm   | Nee                   |

### Pluggenteelt

|                              | Ontwikkelingsstadium 1 | Ontwikkelingsstadium 2                  | Ontwikkelingsstadium 3                  | Ontwikkelingsstadium 4                  |
|------------------------------|------------------------|---|---|---|
| <b>Vochtigheid substraat</b> | Niveau 4               | Niveau 3-4                              | Niveau 3-4                              | Niveau 3                                |
| <b>Temperatuur</b>           | 68-74°F<br>20-23°C     | 65-75°F<br>18-24°C                      | 65-75°F<br>18-24°C                      | 60-70°F<br>16-21°C                      |
| <b>Licht</b>                 | Licht                  | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 f.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| <b>Bemesten</b>              |                        | Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7  | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2       | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2       |
| <b>Groeiregulatoren</b>      |                        |   |   | daminozide/640-950 ppm/Spuiten          |

### Bemestingsaanbeveling

Maak gebruik van een stikstofmeststof met een laag fosforgehalte.

### Belangrijke tips voor vermeerdering

Toepassing van groeiregulatoren of een teelt buiten leidt tot een veel evenwichtiger opbouw van de planten Geef voldoende water aan pellets met meerdere zaden en belicht voor een optimale kieming.

### Teelt tot eindproduct

| Teeltemperatuur                                | pH- en EC-waarden teelsubstraat | Bemesten                          | Daglengte         |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (dag) 60-75°F16-24°C<br>(nacht) 55-60°F13-16°C | 5,8-6,2 pH<br>1,2-1,5 mmhos/cm  | 225 tot 300 ml N - EC 1,5 tot 2,0 | Daglengteneutraal |

### Teeltplanning

| Potmaat / Containermaat | Planten per pot | Teeltduur   | Seizoen  | Groeiregulatoren             |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------------------|
| 4"/4.5"/Quart           | 1 (ppp)         | 4-6 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500 ppm Spuiten |
| 10" Pot of HB/3 Gallon  | 5-6 (ppp)       | 8-9 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500 ppm Spuiten |

## Bemestingsaanbeveling

Maak bij voorkeur gebruik van een stikstofmeststof met een laag fosforgehalte. Indien nodig kan een mengmeststof op basis van ammonium en stikstof worden ingezet om de groei te bevorderen en voor een evenwichtige PH.

## Ziekten en plagen

Insecten: Witte vliegen

## Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Toepassing van groeiregulatoren of een teelt buiten leidt tot een veel evenwichtiger opbouw van de planten. Geef voldoende water aan pellets met meerdere zaden en belicht voor een optimale kieming. Voorkom uitersten zoals erg nat of erg droog. Laat de planten niet verwelken, aangezien dat tot knop- en bloemval leidt.

**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras

---



Pinktopia



Pinktopia

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2019 Ball Horticultural Company