

Bellis Bellissima™ Serie

(*Bellis perennis*)

Teelt van vaste planten (herzien/aangepast 22-02-19)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Half schaduw	Vroege voorjaar, Voorjaar	6-10 in. (15-25 cm)	5-8 in. (13-20 cm)	5-10 in. (13-25 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PEL	512	1-2	5-6	3-5	5,5-6,2 pH 0,5-0,75 mmhos/cm	Ja

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 2-3	Niveau 2
Temperatuur	65-72°F (18-22°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)
Licht	Optioneel	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Bemesten	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

Vernalisatie / Koelperiode

Nee

Belangrijke tips voor vermeerdering

Dek het zaad middelmatig af met grove vermiculiet ter bevordering van de uniformiteit van de zaailingen.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengthe
(dag) 60-65°F (16-18°C) (nacht) 40-45°F (4-7°C)	5,5-6,4 pH 1,1-1,3 mmhos/cm	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	Daglengteneutraal

Teeltplanning

Type gewas	Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
Eenjarig	306 pack	1 (ppp)	6-8 (weken)	Najaar	daminozide 1.000-2.000 ppm Spuiten
Eenjarig	306 pack	1 (ppp)	6-8 (weken)	Winter	daminozide 1.000-2.000 ppm Spuiten
Overwintering	5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	16-24 (weken)	Vroege voorjaar	daminozide 1.000-2.000 ppm Spuiten

Bemestingsaanbeveling

Bemest het gewas iedere 2 weken matig of alleen indien gewenst met 100 tot 150 mg/l N in een volledige, uitgebalanceerde mengmeststof. Handhaaf in het substraat een EC van 1,1 tot 1,3 mS/cm en een pH van 5,5 tot 6,4.

Gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Er kan bladschade ontstaan door een hoge concentratie van propiconazool. Pas daarom de standaarddosering toe of spuit vaker indien nodig.

Ziekten en plagen

Plugplanten die te diep worden uitgeplant kunnen last krijgen van schimmelaantastingen of sterfte van het hart van de plant. Teel niet te nat. Controleer regelmatig op roest, Phoma en bladluizen.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Teel zo koel mogelijk maar voorkom temperaturen onder het vriespunt. Teel om een koel geteeld gewas te forceren de planten gedurende 4 weken voor aflevering bij 55 tot 58°F (10 tot 12°C). Propiconazool (Tilt) kan worden ingezet als groeiregulator met een dosering van 200 tot 300 mg/l.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Red



Rose



Rose Bicolor



White



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company