

## Fuseables® Coleus Serie

(*Solenostemon scutellarioides*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 15-02-18)

Supplied as Fuseables® Precision™ Multi-Pellets.

These easy-to-produce, two to three-variety mixes are ideal for colour bowls, hanging baskets and large patio containers. Precision™ Multi-Pellets make it easy to grow beautiful combos – a “garden in a pellet!” We recommend 1 to 3 plants per 10-in./25-cm container and 3 to 5 plants per 12-in./30-cm container.

### Algemene informatie

| Blootstelling | Bloeiperiode | Hoogte                  | Breedte                 | Plantafstand           |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Half schaduw  | -            | 20-28 in.<br>(51-71 cm) | 12-18 in.<br>(30-46 cm) | 8-12 in.<br>(20-30 cm) |

### Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Het aantal dagen tot de kieming | pH- en EC-waarden zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| PMPL            | 128<br>288          | 1          | 5-6                          | 4-5                             | 5,5-5,8 pH<br>0,75 mmhos/cm     | Lichte afdekking      |

### Pluggenteelt

|                              | Ontwikkelingsstadium 1 | Ontwikkelingsstadium 2                  | Ontwikkelingsstadium 3                  | Ontwikkelingsstadium 4                  |
|------------------------------|------------------------|---|---|---|
| <b>Vochtigheid substraat</b> | Niveau 4               | Niveau 3-4                              | Niveau 2-4                              | Niveau 2-4                              |
| <b>Temperatuur</b>           | 72-75°F<br>22-24°C     | 71-73°F<br>22-23°C                      | 68-70°F<br>20-21°C                      | 59-64°F<br>15-18°C                      |
| <b>Licht</b>                 | Optioneel              | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 f.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| <b>Bemesten</b>              |                        | Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7  | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2       | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2       |

### Teelt tot eindproduct

| Teelttemperatuur                                 | pH- en EC-waarden teeltsubstraat | Bemesten                          | Daglengte             |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| (dag) 65-76°F 18-24°C<br>(nacht) 59-64°F 15-18°C | 5,5-6,0 pH<br>0,7-1,2 mmhos/cm   | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2 | Facultatieve kortedag |

### Teeltplanning

| Potmaat / Containermaat | Planten per pot | Teeltduur   | Seizoen  | Groeiregulatoren                   |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------------------------|
| 5"/6"/1 Gallon          | 1 (ppp)         | 5-7 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten |
| 8"/2 Gallon             | 1 (ppp)         | 5-7 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten |
| 10" Pot of HB/3 Gallon  | 1-3 (ppp)       | 5-7 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten |
| 12" Pot of HB/5 Gallon  | 4-5 (ppp)       | 5-7 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten |

### Bemestingsaanbeveling

Gebruik bij voorkeur een meststof op basis van nitraat met een laag fosfor- en een hoog kaliumgehalte.

### Gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Pas op bij het gebruik van flurprimidol (Topflor) op, omdat deze werkzame stof effect kan hebben op de kleur van het blad.

## Ziekten en plagen

Insecten: Let op bladluizen, wolluizen, witte vliegen  
Ziekten en plagen: Let op Alternaria, Botrytis, Verticillium, valse meeldauw

## Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Coleus reageert op het verschil tussen dag- en nachttemperatuur (DIF). Planten strekken minder bij een negatieve DIF. Te dicht op elkaar telen leidt tot overmatige strekking van de internodiën. Ethefon kan 2 tot 3 weken na het oppotten in een dosering van 300 mg/l worden toegepast om de vertakking te bevorderen en de bloei uit te stellen.

**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras

---



Chocolate  
Symphony



Under the Sun

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2018 Ball Horticultural Company