

## Crossandra Tropic Serie

(*Crossandra infundibuliformis*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

**Plug crop time:** 6 to 7 weeks

**Transplant to finish:** South, 10 to 11 weeks

- Heat-tolerant continuous bloomer makes a premium landscape plant in tropical and semi-tropical areas from Florida to southern Asia.

### Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Late voorjaar, Zomer, Nazomer	10 in. (25 cm)	8 in. (20 cm)	8-10 in. (20-25 cm)

### Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	288	1	7	7-10	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Ja

### Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
<b>Vochtigheid substraat</b>	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3-4	Niveau 3
<b>Temperatuur</b>	78-82°F 26-28°C	70-72°F 21-22°C	70-72°F 21-22°C	70-72°F 21-22°C
<b>Licht</b>	Optioneel	1.000-1.500 f.c. (10.800-16.100 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
<b>Bemesten</b>		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

### Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
<b>(dag)</b> 75-80°F/24-27°C <b>(nacht)</b> 68-75°F/20-24°C	5,8-6,5 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5	Daglengteneutraal

### Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	10-11 (weken)	Voorjaar	-
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	10-11 (weken)	Voorjaar	-

### Bemestingsaanbeveling

Bemest bij iedere gietbeurt met 175 tot 225 mg/l 15-0-15 of 15-5-15. Gebruik mengmeststof 20-10-20 waar nodig voor de verdere ontwikkeling van het blad. Handhaaf een substraat-EC van ongeveer 1,2 mS/cm.

### Ziekten en plagen

Insecten: bladluizen, mijten, witte vliegen Ziekten en plagen: Pythium wortelrot, Rhizoctonia

## Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Meest geschikt voor (sub)tropische klimaatzones. Reken bij teelten in koelere (noordelijkere) regionen met een 3 weken langere teeltduur of teel voor de afzet in de zomer.

**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras

---



Flame



Yellow Splash

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2018 Ball Horticultural Company