

## Cyclamen Dreamscape™ F<sub>1</sub> Serie

(*Cyclamen persicum*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 24-02-20)

### Algemene informatie

Blotstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Schaduw, Half schaduw	Vroege voorjaar, Nazomer, Najaar, Winter	6-9 in. (15-23 cm)	9-13 in. (23-33 cm)	9-15 in. (23-38 cm)

### Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	288 128	1 1	11-12 14	19-21	5,6-5,8 pH 0,8 mmhos/cm	Ja

### Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
<b>Vochtigheid substraat</b>	Niveau 4-5	Niveau 4-5	Niveau 3-4	Niveau 2-3
<b>Temperatuur</b>	64°F (18°C)	62-64°F (17-18°C)	61-64°F (16-18°C)	61-64°F (16-18°C)
<b>Licht</b>	Donker	10-15 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup>		
<b>Bemesten</b>	Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)

### Belangrijke tips voor vermeerdering

Een optie is de plugplant in een 60- of 72-gaats tray op te planten en de pluggenteeltfase met 6 tot 7 weken te verlengen tot het oppotten. Dat verkort de teeltduur na het oppotten, terwijl de plugplanten langer kunnen worden geteeld onder gecontroleerde condities.

### Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
<b>(dag)</b> 62-64°F (17-18°C) <b>(nacht)</b> 54-59°F (12-15°C)	5,6-5,8 pH 0,8-1,2 mmhos/cm	225 tot 300 ml N (EC 1,5 tot 2,0)	Daglengteneutraal

### Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	18-20 (weken)	Najaar	-

### Ziekten en plagen

Ziekten en plagen Botrytis, Chalara, Colletotrichum, Erwinia, Fusarium oxysporum, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia en Cylindrocarpon  
Ziekten en plagen: Bladluizen, rupsen (Duponchelia), trips, cycloammiten, rouwmuggen en oevervliegen

### Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Het gebruik van 80- of 72-gaats trays verkort de teeltduur na het oppotten met 6 tot 7 weken.

**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras

---



Bright Red



Deep Burgundy



Deep Rose



Purple



Salmon Eye



White



Dark Flamed  
Mixture



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2021 Ball Horticultural Company