

## Dusty Miller Maritima Silverdust

(*Cineraria maritima/Senecio cineraria*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

**Plug crop time:** 4 to 5 weeks

**Transplant to finish:** 7 to 8 weeks

- Finely cut, silvery white, velvety foliage on uniform plants.
- Adds contrast and texture to beds and borders.
- Size and uniform habit also make Silverdust perfect for container plantings.
- Seed is graded for more uniform germination.

### Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	-	10 in. (25 cm)	10 in. (25 cm)	10-12 in. (25-30 cm)

### Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PEL, RAW	288	1	4-5	3-5	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

### Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
<b>Vochtigheid substraat</b>	Niveau 4	Niveau 4-2	Niveau 3-2	Niveau 3-2
<b>Temperatuur</b>	72-75°F 22-24°C	70-75°F 21-24°C	65-70°F 18-21°C	60-62°F 16-17°C
<b>Licht</b>	Optioneel	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
<b>Bemesten</b>		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2
<b>Groeiregulatoren</b>			daminozide/2.500-5.000 ppm/Spuiten	

### Bemestingsaanbeveling

Dien na het volledig ontvouwen van de zaadlobben bij iedere irrigatiebeurt een mengmeststof 14-0-14 toe in een dosering van 50 tot 75 mg/l. Verhoog de bemesting in ontwikkelingsstadium 3 naar 100 tot 175 mg/l; wissel daarbij 20-10-20 af met 14-0-14 mengmeststof.

### Belangrijke tips voor vermeerdering

Er wordt een preventieve toepassing van een fungicide tegen Alternaria aanbevolen. Houd het blad zo droog als het kan, om de kans op ziekten te verminderen.

### Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
<b>(dag)</b> 60-65°F/16-18°C <b>(nacht)</b> 55-58°F/13-14°C	5,5-5,8 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5	-

## Teeltplanning

---

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	6-8 (weken)	Voorjaar	daminozide 5.000 ppm Spuiten
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	6-8 (weken)	Voorjaar	daminozide 5.000 ppm Spuiten

### Bemestingsaanbeveling

Bemest met 175 tot 225 mg/l 14-0-14 om de vorming van het zilveren poederlaagje op het blad te bevorderen.

### Ziekten en plagen

Ziekten en plagen: Bladaantastingen. Neem voorzorgsmaatregelen en houd het blad zo droog als het kan.

### Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Toppen wordt niet aanbevolen. Pas indien nodig daminozide (B-Nine/Alar) toe om strekken tegen te gaan.

**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras

---



Silverdust



Silverdust

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2018 Ball Horticultural Company