

Euphorbia Glamour

(*Euphorbia graminea*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 24-02-20)

Algemene informatie

| Blootstelling | Bloeiperiode | Hoogte | Breedte | Plantafstand |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zon | Voorjaar, Late voorjaar, Zomer, Nazomer, Najaar, Winter | 15-24 in. (38-61 cm) | 15-24 in. (38-61 cm) | 14-16 in. (36-41 cm) |

Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Het aantal dagen tot de kieming | pH- en EC-waarden zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| RAW | 288 128 | 1 2 | 4-5 4-5 | 3-6 | 5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm | Optioneel |

Pluggenteelt

| | Ontwikkelingsstadium 1 | Ontwikkelingsstadium 2 | Ontwikkelingsstadium 3 | Ontwikkelingsstadium 4 |
|------------------------------|------------------------|---|---|---|
| Vochtigheid substraat | Niveau 4 | Niveau 4 | Niveau 3-4 | Niveau 2-3 |
| Temperatuur | 65-72°F (18-22°C) | 65-72°F (18-22°C) | 65-72°F (18-22°C) | 65-72°F (18-22°C) |
| Licht | Optioneel | 1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux) |
| Bemesten | | Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7 | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2 | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2 |
| Groeiregulatoren | | | daminozide/2.500 ppm/Spuiten | daminozide/2.500-5.000 ppm/Spuiten |

Belangrijke tips voor vermeerdering

Vermijd temperaturen onder de 16°C, omdat lagere temperaturen geelverkleuring van het blad veroorzaken. Zaai bij 128-gaats-trays en groter met 2 zaden per plug. Daminozide kan worden ingezet om strekken tegen te gaan. De eerste bespuiting dient plaats te vinden bij de verschijning van het eerste echte blad. De tweede behandeling volgt 7 dagen later. Een alternatief voor daminozide is een spuit-gietbehandeling met paclobutrazol met een dosering van 2,5 mg/l, of een gietbehandeling met een dosering van 0,25 tot 0,50 mg/l op het moment dat de kiemwortel verschijnt. Dit is effectief gebleken bij het beheersen van de strekking van de stengel. Glamour is een groeikrachtig ras. Dus dit is de gouden tip. Volg een van deze behandelingen in fase 3 op met een eenmalige spuitbeurt met daminozide in een dosering van 2.500 tot 5.000 ppm.

Teelt tot eindproduct

| Teelttemperatuur | pH- en EC-waarden teeltsubstraat | Bemesten | Daglengte |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (dag) 65-77°F (18-25°C) (nacht) 65-68°F (18-20°C) | 5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm | 175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5 | Daglengteneutraal |

Teeltplanning

| Potmaat / Containermaat | Planten per pot | Teeltduur | Seizoen | Groeiregulatoren |
|-------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------------------------|
| 5"/6"/1 Gallon | 1-2 (ppp) | 5-8 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten |
| 8"/2 Gallon | 2 (ppp) | 6-8 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten |

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Teel niet bij temperaturen onder de 16°C. Te veel gestrekte plugplanten kunnen eventueel dieper worden opgepot om toch een gewenste plantopbouw te verkrijgen. Toppen is niet noodzakelijk. Daminozide kan het volledig in bloei komen van de planten vertragen, maar bevordert bij toepassing in een vroegtijdig stadium wel de vertakking. Als er wordt begonnen met een bespuiting met daminozide, kan ter afronding een spuitbehandeling met paclobutrazol (10 mg/l) of een gietbehandeling in een lage dosering (1-2 mg/l) worden overwogen. Hogere temperaturen en meer licht kunnen de teeltduur beduidend verkorten.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Glamour



Glamour



Glamour



Glamour

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company