

Lisianthus Florida F₁ Serie

(*Eustoma grandiflorum*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

Plug crop time: 8 to 10 weeks

Transplant to finish: 12 to 16 weeks

- Our most heat-tolerant series for garden use; can also be used in potted plant programs.
- Resists rosetting in both plug stage and after transplanting.
- Single-plant in 4.5-in./12-cm or multi-plant in larger container.

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Late voorjaar, Zomer, Nazomer	8-10 in. (20-25 cm)	6-8 in. (15-20 cm)	6-10 in. (15-25 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PEL	288 512	1 1	8 6-7	8-12	6,2-6,5 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 2-3	Niveau 1-3	Niveau 1-3
Temperatuur	72-77°F 22-25°C	68-72°F 20-22°C	65-68°F 18-20°C	62-65°F 17-18°C
Licht	Licht			
Bemesten		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

Bemestingsaanbeveling

Bemest indien nodig met een 14-0-14 mengmeststof of calcium-/kaliumnitraatmeststof in een dosering van 100 tot 175 mg/l N.

Belangrijke tips voor vermeerdering

Handhaaf een pH van 6,5 tot 6,8. Laat lisianthus niet zo lang in de trays dat de plugplanten draaiwortels gaan vormen, aangezien dat de vertakking van onderaf sterk afremt. Plugplanten met draaiwortels hebben bovendien de neiging korter te bloeien en zijn niet uniform.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 68-75°F/20-24°C (nacht) 60-65°F/16-18°C	6,5-6,8 pH 0,75 mmhos/cm	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	Facultatieve langedag

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	14-16 (weken)	Voorjaar	-
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	14-16 (weken)	Voorjaar	-

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Handhaaf in het substraat een pH van 6,5 tot 6,8. Laat de zaailingen geen draaiwortels vormen.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Blue



Pink



Silver

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company