

Heuchera Palace Purple

(*Heuchera micrantha*)

Teelt van vaste planten (herzien/aangepast 20-01-21)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Schaduw, Half schaduw	Zomer, Nazomer	10-20 in. (25-51 cm)	14-16 in. (36-41 cm)	24-36 in. (61-91 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Aantal dagen van 50% tot maximale kieming	pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PEL	288 128*	4 6	6-8 8-9	7-10	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

* Aanbevolen plugmaat voor in bloei trekken

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4-5	Niveau 4-3	Niveau 3	Niveau 2
Temperatuur	68-72°F (20-22°C)	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
Licht	Licht	2.000-2.500 f.c. (21.500-26.900 Lux)	2.000-2.500 f.c. (21.500-26.900 Lux)	2.500-3.500 f.c. (26.900-37.700 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)

Vernalisatie / Koelperiode

Nee - vernalisatie is niet nodig wanneer Palace Purple als bladplant wordt verkocht.

Belangrijke tips voor vermeerdering

Informatie over het forceren: Zie de Perennials Forcing Guide (gids voor het forceren van vaste planten). S্পuit met een fungicide tegen de omvalziekte bij zaailingen. OPMERKING: Palace Purple is als plug en eindproduct sneller te telen dan Melting Fire.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 65-68°F (18-20°C) (nacht) 60-65°F (16-18°C)	5,8-6,2 pH 1,2-1,4 mmhos/cm	175 tot 225 ml N (EC 1,2 tot 1,5)	Daglengteneutraal

Teeltplanning

Type gewas	Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
Geforceerde teelt	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	10-11 (weken)	Late voorjaar, Gemiddelde dagtemperatuur 68°F (20°C)	-
Geforceerde teelt	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	9-10 (weken)	Najaar, Gemiddelde dagtemperatuur 68°F (20°C)	-
Geforceerde teelt	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	10-11 (weken)	Najaar, Gemiddelde dagtemperatuur 68°F (20°C)	-
Overwintering	5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	26-32 (weken)	Voorjaar	-
Overwintering	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	28-32 (weken)	Voorjaar	-
Geforceerde teelt	5"/6"/1 Gallon	1-2 (ppp)	11-12 (weken)	Late voorjaar, Gemiddelde dagtemperatuur 68°F (20°C)	-

Bemestingsaanbeveling

Dien bij iedere tweede gietbeurt een 15-0-15 bemesting toe met 150 tot 200 mg/l N. Handhaaf een substraat-EC van ongeveer 1,0 mS/cm (1:2-extractie).

Ziekten en plagen


Insecten: Bladnematoden Ziekten en plagen: echte meeldauw, Botrytis, bladvlekken, roest, wortelrot

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Plant de pluggen niet te diep. Houd de bovenkant van de plug gelijk aan de omringende grond. Teel relatief droog. Vochtig, goed doorlatend substraat gewenst.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Palace Purple

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company