

Iberis Whiteout

(*Iberis sempervirens*)

Teelt van vaste planten (herzien/aangepast 22-02-19)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Vroege voorjaar, Voorjaar	6-8 in. (15-20 cm)	8-12 in. (20-30 cm)	14 in. (36 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	288	3-4	7-8	4-7	5,5-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Ja

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 2	Niveau 2
Temperatuur	61-65°F (16-18°C)	61-65°F (16-18°C)	61-65°F (16-18°C)	61-65°F (16-18°C)
Licht	Optioneel	2.000-2.500 f.c. (21.500-26.900 Lux)	2.000-2.500 f.c. (21.500-26.900 Lux)	4.000-5.000 f.c. (43.100-53.800 Lux)

Bemesten

Vernalisatie / Koelperiode

Ja - minimaal 8 tot 10 weken Planten moeten 8 tot 10 weken de tijd hebben gehad om volume te maken voordat ze een koudebehandeling ondergaan.

Belangrijke tips voor vermeerdering

Toppen is niet nodig.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 60-72°F (16-22°C) (nacht) 41-50°F (5-10°C)	5,5-6,2 pH 1,2-1,4 mmhos/cm	175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5	Daglengteneutraal

Teeltplanning

Type gewas	Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
Overwintering	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	26-36 (weken)	Vroege voorjaar	-

Bemestingsaanbeveling

Whiteout behoeft over het algemeen een gemiddelde bemesting. Pas een bemesting toe op niveau 3 (175 tot 210 mg/l N; EC van 1,2 tot 1,4 mS/cm).

Ziekten en plagen

Insecten: Mijten, naaktslakken Ziekten en plagen: Botrytis, valse meeldauw Opmerking: Valse meeldauw leidt tot bladval.

Teeltmaatregelen voor meer bossige (vertakte) planten

Zaailingen dienen voor vernalisatie 10 tot 12 echte bladeren te hebben.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Toppen is niet nodig. Geef voldoende gelegenheid om volume te maken; teel in een actief klimaat. Controleer regelmatig op echte en valse meeldauw en spuit hier preventief tegen.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Whiteout

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company