

Isotoma Gemini F₁ Serie

(*Isotoma hybrida*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

Plug crop time: 4 to 5 weeks

Transplant to finish: 9 to 10 weeks

- Vigorous, free-flowering series delivers excellent garden performance, yet keeps a controlled, mounded habit in containers.
- Easy to grow – well-matched for earliness and uniformity.
- Works well in premium pack and 3.5 to 4-in./9 to 10-cm programs.
- Single, star-shaped blooms over finely cut foliage.

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Voorjaar, Zomer, Najaar	8 in. (20 cm)	10-14 in. (25-36 cm)	10-14 in. (25-36 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PEL	288	2-4	4-5	5-8	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3
Temperatuur	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	65-68°F 18-20°C	65-68°F 18-20°C
Licht	Optioneel	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2
Groeiregulatoren			daminozide/1.000-1.500 ppm/Spuiten	

Belangrijke tips voor vermeerdering

Zorg tijdens de teelt voor een preventieve bestrijding met fungiciden ter voorkomen van de omvalziekte.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 60-66°F/16-19°C (nacht) 54-57°F/12-14°C	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	225 tot 300 ml N - EC 1,5 tot 2,0	Facultatieve langedag

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
306 pack	1 (ppp)	9-10 (weken)	Voorjaar	daminozide 2.500-3.500 ppm Spuiten
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	9-12 (weken)	Voorjaar	daminozide 2.500-3.500 ppm Spuiten
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	12-14 (weken)	Voorjaar	daminozide 2.500-3.500 ppm Spuiten

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Teel bij voorkeur onder koelere omstandigheden. Temperaturen van boven de 70°F (21°C) kunnen de bloei vertragen, of de bloei kan geheel achterwege blijven.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Blue



Pink

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company