

Petunia (Spreading) Shock Wave® F₁ Serie

(*Petunia x hybrida*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 24-02-20)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Voorjaar, Late voorjaar, Zomer, Nazomer	7-10 in. (18-25 cm)	20-30 in. (51-76 cm)	10-15 in. (25-38 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PEL	288 128	1 1	4-6 5-7	3-5	5,5-6,0 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4-5	Niveau 3-4	Niveau 2-4	Niveau 2-4
Temperatuur	72-75°F (22-24°C)	68-75°F (20-24°C)	65-70°F (18-21°C)	60-65°F (16-18°C)
Licht	Optioneel	6 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	8-12 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2.500-4.000 f.c. (26.900-43.100 Lux)	8-15 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2
Groeiregulatoren			daminozide/2.500-5.000 ppm/Spuiten	daminozide/2.500-5.000 ppm/Spuiten

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 61-75°F (16-24°C) (nacht) 57-65°F (14-18°C)	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	225 tot 300 ml N - EC 1,5 tot 2,0	Facultatieve langedag

Aanbevolen daglengte

Per ras vereiste minimale daglengte:

10 uur: Coral Crush, Denim, Pink Shades, Red

10,5 uur: Pink Vein, Deep Purple, Purple Tie Dye, Rose

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulators
306 pack	1 (ppp)	5-6 (weken)	Voorjaar	paclobutrazol 3-5 ppm Aangietbehandeling
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (weken)	Voorjaar	paclobutrazol 3-5 ppm Aangietbehandeling
10" Pot of HB/3 Gallon	3-4 (ppp)	6-8 (weken)	Voorjaar	paclobutrazol 3-5 ppm Aangietbehandeling
306 pack	1 (ppp)	4-5 (weken)	Zomer	paclobutrazol 3-5 ppm Aangietbehandeling
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	4-5 (weken)	Zomer	paclobutrazol 3-5 ppm Aangietbehandeling
10" Pot of HB/3 Gallon	3-4 (ppp)	5-6 (weken)	Zomer	paclobutrazol 3-5 ppm Aangietbehandeling

Ziekten en plagen

Insecten: Trips, bladluizen, rouwmuggen, oevervliegen Ziekten en plagen: Botrytis, Rhizoctonia, Pythium

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Een bespuiting met 3,5 tot 5,0 g/l daminozide, 7 tot 10 dagen na het oppotten, bevordert de vertakking en voorkomt een te vroege strekking. Er kan behandeld worden met flurprimidol (Topflor) in plaats van paclobutrazol. Houd dan een hoeveelheid aan van 2/3 paclobutrazol. De temperatuur bij de teelt mag dalen tot 50°F (10°C). De teeltduur is bij een juiste daglengte gerelateerd aan de gemiddelde dagtemperatuur. Planten komen later in bloei bij een teelt onder koelere omstandigheden. Aanbevolen DLI van 12 tot 20 mol·m⁻²·d⁻¹. Rassen geschikt voor koude teelten: Denim, Pink Shades, Pink Vein, Purple Tie Dye Rassen die gevoelig zijn voor lage temperaturen: Coral Crush, Deep Purple, Red, Rose

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras

