

Plectranthus Silver Crest

(*Plectranthus argentatus*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

Plug crop time: 5 to 6 weeks

Transplant to finish: 4 to 6 weeks

- Compact accent plant is an easy and economical choice for mixed containers, baskets and landscapes.
- Tolerant of heat and water stress.
- Silvery green, fuzzy foliage and small, bluish white flowers on well-branched, trailing plants.

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Half schaduw, Zon	Voorjaar, Late voorjaar, Zomer	8-10 in. (20-25 cm)	18-24 in. (46-61 cm)	18-24 in. (46-61 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	288	1	5-6	4-5	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2-3	Niveau 2-3
Temperatuur	64-72°F 18-22°C	68-72°F 20-22°C	68-72°F 20-22°C	65-72°F 18-22°C
Licht	Licht	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2
Groeiregulatoren			daminozide/600-1.200 ppm/Spuiten	

Belangrijke tips voor vermeerdering

Toppen is niet nodig. Indien nodig zorgt een daminozide bespuitingen voor krachtiger plugplanten.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 64-80°F/18-27°C (nacht) 61-68°F/16-20°C	5,8-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5	-

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	4-6 (weken)	Voorjaar	daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten
10" Pot of HB/3 Gallon	3 (ppp)	6-7 (weken)	Voorjaar	daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten

Bemestingsaanbeveling

Bemest 1 maal per week op niveau 3 (175 tot 225 mg/l N; 1,2 tot 1,5 mS/cm zoutgehalte EC) met een stikstofmeststof met een laag fosforgehalte. Pas indien gewenst een mengmeststof toe op basis van ammonium en stikstof. Bij een vast bemestingsprogramma kan meststof op niveau 2 (100 tot 175 mg/l N; 0,7 tot 1,2 mS/cm EC) worden toegepast bij handhaving van de hiervoor genoemde aanbevolen EC- en pH-waarden.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Toppen is niet vereist. De gebogen scheut van Silver Crest ontwikkelt zich duidelijk in één richting. Houd daar goed rekening mee bij het oppotten van meerdere plugplanten in de eindpot. Herhaal indien nodig de behandeling met groeiregulatoren. Hogere doseringen van groeiregulatoren zijn nodig wanneer in kleine potten wordt geteeld of bij weinig licht.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Silver Crest



Silver Crest



Silver Crest



Silver Crest

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company