

## Squash Butterbaby

(Cucurbita moschata)

Teelt van groentegewassen (herzien/aangepast 18-10-24)

### Algemene informatie

| Blootstelling | Bloeiperiode  | Hoogte                 | Breedte                    | Plantafstand            |
|---------------|---------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Zon           | Zomer, Najaar | 8-12 in.<br>(20-30 cm) | 84-120 in.<br>(213-305 cm) | 26-36 in.<br>(66-91 cm) |

### Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat       | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Aantal dagen van 50% tot maximale kieming | pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| RAW             | Rechtstreeks zaaien<br>72 | 1-2<br>1   | 3-4<br>2-3                   | 2-4                                       | 5,8-6,2 pH<br>0,75 mmhos/cm        | Ja                    |

### Pluggenteelt

|                              | Ontwikkelingsstadium 1                    | Ontwikkelingsstadium 2                    | Ontwikkelingsstadium 3                    | Ontwikkelingsstadium 4                    |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Vochtigheid substraat</b> | Niveau 4                                  | Niveau 3-4                                | Niveau 2-3                                | Niveau 2-3                                |
| <b>Temperatuur</b>           | 70-75°F<br>(21-24°C)                      | 65-70°F<br>(18-21°C)                      | 65-70°F<br>(18-21°C)                      | 65-70°F<br>(18-21°C)                      |
| <b>Licht</b>                 | Optioneel                                 | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux)   | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux)   | 2.500-5.000 f.c.<br>(26.900-53.800 Lux)   |
| <b>Bemesten</b>              | Minder dan 100 ml N<br>(EC lager dan 0,7) | Minder dan 100 ml N<br>(EC lager dan 0,7) | Minder dan 100 ml N<br>(EC lager dan 0,7) | Minder dan 100 ml N<br>(EC lager dan 0,7) |

### Belangrijke tips voor vermeerdering

Beste teeltresultaat bij direct zaaien in de eindpot. Lengtegroei kan worden beheerst door minder te bemesten, te veel water te voorkomen, telen onder hoge lichtintensiteit en indien mogelijk DIF toe te passen.

### Teelt tot eindproduct

| Teelttemperatuur                                     | pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat | Bemesten                             | Daglengte |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| (dag) 68-72°F (20-22°C)<br>(nacht) 60-65°F (16-18°C) | 5,8-6,2 pH<br>0,75-1,0 mmhos/cm     | 100 tot 175 ml N<br>(EC 0,7 tot 1,2) | -         |

### Aantal dagen tot rijpe vruchten

100-105 (direct sow)

### Teeltplanning

| Potmaat / Containermaat    | Planten per pot | Teeltduur     | Seizoen  | Groeiregulatoren |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------|------------------|
| Multiplaat/Tray (Cup Pack) | 1-2 (ppp)       | 2-3 (weken)   | Voorjaar | -                |
| 4"/4,5"/Quart              | 1-2 (ppp)       | 2-3 (weken)   | Voorjaar | -                |
| Vollegrondsteelt           | 1 (ppp)         | 14-15 (weken) | Voorjaar | -                |

### Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Zaai rechtstreeks in de eindpot. Beste teeltresultaat bij vollegrondsteelt. Rankende planten kunnen om ruimte te besparen worden opgebonden aan rekjes en dergelijke.

**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras

---



Butterbaby



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2026 Ball Horticultural Company