

ColorGrass® Juncus Javelin

(*Juncus pallidus*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

Plug crop time: 5 to 6 weeks

Transplant to finish: 5 to 6 weeks

Developed from unique genetics and available only from PanAmerican Seed, Javelin makes a dramatic “thriller” for mixed containers. Can grow up to 5 ft./1.5 m tall in gardens/landscapes. Rugged, upright plant can grow in standing water, but also handles heat/drought. Provides great Winter interest, maintaining upright, stiff, straw-colour foliage.

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	-	48 in. (122 cm)	18-20 in. (46-51 cm)	18-22 in. (46-56 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
MPL	288	1	5-6	5-6	5,5-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2-3	Niveau 2-3
Temperatuur	71-76°F 22-24°C	64-70°F 18-21°C	64-68°F 18-20°C	64-66°F 18-19°C
Licht	Licht	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

Bemestingsaanbeveling

Maak gebruik van een stikstofmeststof met een laag fosforgehalte.

Belangrijke tips voor vermeerdering

Ter voorkoming van het uitbuigen van het blad kan een bespuiting met 30 mg/l paclobutrazol (Bonzi) worden toegepast.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 62-74°F 17-23°C (nacht) 59-64°F 15-18°C	5,5-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5	Daglengteneutraal

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
306 pack	1 (ppp)	5-6 (weken)	Voorjaar	-
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (weken)	Voorjaar	-
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	6-7 (weken)	Voorjaar	-

Bemestingsaanbeveling

Pas een stikstofmeststof toe met een laag fosforgehalte. Voorkom een teveel aan ammonium, stikstof en bemesting in het algemeen, omdat dit resulteert in minder opgaande planten.

Ziekten en plagen

Plant de plugplanten niet te diep.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Ter voorkoming van het uitbuigen van het blad kan een bespuiting met 30 mg/l paclobutrazol (Bonzi) worden toegepast.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Javelin

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company