

ColorGrass® Anemanthele Sirocco

(*Anemanthele lessoniana*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 10-01-18)

Complementary colour

The ColorGrass Collection lets you grow and sell the broadest range of ornamental grasses from seed! These unique varieties accent landscapes and containers with height, colour and texture.

Plug crop time: 5 to 6 weeks

Transplant to finish: 6 to 8 weeks

The only pink grass from seed – colour turns to shades of copper and pink under cool conditions, natural sunlight and maturity. Adds movement and texture to landscapes, gardens, mixed containers and baskets.

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	-	12-14 in. (30-36 cm)	22-24 in. (56-61 cm)	25-30 in. (64-76 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
MPL	288	1	5-6	5-6	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2-3	Niveau 2-3
Temperatuur	65-76°F 18-24°C	65-70°F 18-21°C	65-70°F 18-21°C	65-67°F 18-19°C
Licht	Optioneel	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

Bemestingsaanbeveling

Maak gebruik van een stikstofmeststof met een laag fosforgehalte.

Belangrijke tips voor vermeerdering

Kleurt beter bij koele teeltomstandigheden en bij veel licht. Als de temperatuur het toelaat, is het beter om Sirocco buiten te telen.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 62-74°F 17-23°C (nacht) 59-64°F 15-18°C	5,5-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	Daglengteneutraal

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
306 pack	1 (ppp)	6-8 (weken)	Voorjaar	-
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	6-8 (weken)	Voorjaar	-
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	6-8 (weken)	Voorjaar	-
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	6-8 (weken)	Voorjaar	-
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	8-10 (weken)	Voorjaar	-

Bemestingsaanbeveling

Pas een stikstofmeststof toe met een laag fosforgehalte. Voorkom een teveel aan ammonium, stikstof en bemesting in het algemeen, omdat dit resulteert in minder opgaande planten.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Kleurt beter bij koele teeltomstandigheden en bij veel licht. Als de temperatuur het toelaat, is het beter om Sirocco buiten te telen.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Sirocco



Sirocco

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2018 Ball Horticultural Company