

Fuseables[®] Bacopa Serie

(*Sutera cordata*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 14-08-19)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Vroege voorjaar, Voorjaar, Late voorjaar, Zomer, Nazomer, Najaar	2-6 in. (5-15 cm)	12-18 in. (30-46 cm)	8-20 in. (20-51 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PMPL	128 288	1	4-5	4	5,5-6,0 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3-4	Niveau 3
Temperatuur	68-73°F (20-23°C)	68-70°F (20-21°C)	65-70°F (18-21°C)	59-65°F (15-18°C)
Licht	Licht	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 59-76°F (15-24°C) (nacht) 55-60°F (13-16°C)	5,8-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 tot 225 ml N (EC 1,2 tot 1,5)	Daglengteneutraal

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	6-7 (weken)	Voorjaar	daminozide 1.000-1.500 ppm Spuiten
8"/2 Gallon	3 (ppp)	6-7 (weken)	Voorjaar	daminozide 1.000-1.500 ppm Spuiten
10" Pot of HB/3 Gallon	4 (ppp)	6-7 (weken)	Voorjaar	daminozide 1.000-1.500 ppm Spuiten
12" Pot of HB/5 Gallon	4 (ppp)	6-7 (weken)	Voorjaar	daminozide 1.000-1.500 ppm Spuiten

Bemestingsaanbeveling

Bemest bij voorkeur met een stikstofmeststof met een laag fosforgehalte.

Ziekten en plagen

Insecten: Houd witte vliegen in de gaten

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Vermijd overmatig watergeven en voorkom droogte. Laat de planten niet verwelken omdat dit knopval veroorzaakt.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Utopia

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company