

Crossandra Tropic Serie

(*Crossandra infundibuliformis*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 24-02-20)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Late voorjaar, Zomer, Nazomer	10 in. (25 cm)	8 in. (20 cm)	8-10 in. (20-25 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Aantal dagen van 50% tot maximale kieming	pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	288	1	7	7-10	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Ja

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3-4	Niveau 3
Temperatuur	78-82°F (26-28°C)	70-72°F (21-22°C)	70-72°F (21-22°C)	70-72°F (21-22°C)
Licht	Optioneel	1.000-1.500 f.c. (10.800-16.100 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 75-80°F (24-27°C) (nacht) 68-75°F (20-24°C)	5,8-6,5 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 tot 225 ml N (EC 1,2 tot 1,5)	Daglengteneutraal

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	10-11 (weken)	Voorjaar	-
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	10-11 (weken)	Voorjaar	-

Bemestingsaanbeveling

Bemest bij iedere gietbeurt met 175 tot 225 mg/l 15-0-15 of 15-5-15. Gebruik mengmeststof 20-10-20 waar nodig voor de verdere ontwikkeling van het blad. Handhaaf een substraat-EC van ongeveer 1,2 mS/cm.

Ziekten en plagen

Insecten: bladluizen, mijten, witte vliegen Ziekten en plagen: Pythium wortelrot, Rhizoctonia

Belangrijke tips voor teelt eindproduct


Meest geschikt voor (sub)tropische klimaatzones. Reken bij teelten in koelere (noordelijkere) regionen met een 3 weken langere teeltduur of teel voor de afzet in de zomer.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Flame



Yellow Splash



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2024 Ball Horticultural Company