

## Cuphea Pink Shimmer

(*Cuphea ramosissima*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 23-10-18)

### Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Half schaduw, Zon	Vroege voorjaar, Voorjaar, Late voorjaar, Zomer	10-16 in. (25-41 cm)	12-18 in. (30-46 cm)	8-12 in. (20-30 cm)

### Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PMPL	288	4	4	4-5	5,4-5,8 pH 1,5 mmhos/cm	Nee

### Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
<b>Vochtigheid substraat</b>	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2-4	Niveau 2-4
<b>Temperatuur</b>	72-77°F (22-25°C)	72-77°F (22-25°C)	72-77°F (22-25°C)	72-77°F (22-25°C)
<b>Licht</b>	Licht	10-12 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup> 1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	10-15 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup> 1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	10-20 mol·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup> 2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
<b>Bemesten</b>	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

#### Groeiregulatoren

daminozide/2.500 ppm/Spuiten  
paclobutrazol/1 ppm/Spuiten

### Belangrijke tips voor vermeerdering

Groeiregulatie alleen toepassen in fase 3. Spuit onder warmere omstandigheden met 1 ppm paclobutrazol (Bonzi). Spuit onder koelere omstandigheden met 2.500 ppm daminozide (B-Nine).

### Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 70-75°F (21-24°C) (nacht) 65-68°F (18-20°C)	5,8-6,5 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5	Daglengteneutraal

### Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
Multiplaat/Tray (Cup Pack)	1 (ppp)	5-7 (weken)	Voorjaar	paclobutrazol 2 ppm Spuiten
306 pack	1 (ppp)	5-7 (weken)	Voorjaar	paclobutrazol 2 ppm Spuiten
5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	6-8 (weken)	Voorjaar	-
10" Pot of HB/3 Gallon	3-4 (ppp)	9-10 (weken)	Voorjaar	-
12" Pot of HB/5 Gallon	4-5 (ppp)	10-11 (weken)	Voorjaar	-

## Bemestingsaanbeveling

Cuphea ramosissima reageert op een bespuiting met 2 ppm paclobutrazol en 5.000 ppm daminozide. De plant groeit snel door de daminozide heen. Spuiten met paclobutrazol in een lage dosering houdt de planten veel langer onder controle en verlengt de periode dat ze op de verkooptafel kunnen staan. Grotere maten zijn acceptabel zonder toepassing van groeiregulatie wanneer deze op tijd worden getransporteerd en afgezet. Spuiten met paclobutrazol in een lage dosering houdt de planten langer onder controle en zorgt bovendien voor een ietwat donkerder groen en stevigere stellen.

## Gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Spuit niet met ethefon (Florel) of een tankmix met ethefon, omdat dit kan leiden tot fytotoxiciteit.

## Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Aangietbehandeling met een fungicide na oppotten Gebruik een zeer luchtig substraat. Presteert niet goed in te zware substraten. Geef niet te veel water. Veel licht gaat het strekken tegen. Slechte lichtomstandigheden leiden tot minder vertakken.

**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras

---



Pink Shimmer



Pink Shimmer

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2019 Ball Horticultural Company