GrowerFacts

PanAmericanSeed®

Dahlia Figaro™ Serie

(Dahlia x hybrida)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 21-06-22)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Half schaduw	Voorjaar, Late voorjaar, Zomer, Nazomer, Najaar	14-18 in. (36-46 cm)	10-12 in. (25-30 cm)	10-14 in. (25-36 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Aantal dagen van 50% tot maximale kieming	pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	288	1	4-5	3-7	5,5-5,8 pH 0,5-0,75 mmhos/cm	Ja

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 3	Niveau 3	Niveau 2-3	Niveau 2-3
Temperatuur	68-73°F (20-23°C)	68-73°F (20-23°C)	65-70°F (18-21°C)	65-70°F (18-21°C)
Licht		1.500-3.000 f.c. (16.100-32.300 Lux)	1.500-3.000 f.c. (16.100-32.300 Lux)	2.500-4.000 f.c. (26.900-43.100 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)

Belangrijke tips voor vermeerdering

Wanneer een aparte kiemruimte wordt gebruikt, breng dan de trays over naar de kas bij de eerste tekenen van kieming.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 52-60°F (11-16°C) **(nacht)** 52-60°F (11-16°C)	5,8-6,2 pH 0,75-1,0 mmhos/cm	225 tot 300 ml N (EC 1,5 tot 2,0)	Obligate (kwalitative) langedag

Aanbevolen daglengte

De ideale daglengte voor Dahlia Figaro ligt tussen de 12 en 14 uur. Korte dagen zorgen voor knolvorming. Té lange dagen (≥16 uur) houden de planten meer vegetatief en vertragen de bloei-inductie.

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
306 pack	1 (ppp)	5-6 (weken)	Voorjaar	-
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	5-6 (weken)	Voorjaar	-

Gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Ancymidol (A-Rest), paclobutrazol (Bonzi), daminozide (B-Nine/Alar) en chloormequat (Cycocel) kunnen worden toegepast als groeiregulator.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Reageert sterk op daminozide (B-Nine/Alar). Reageert tevens op het verschil tussen dag- en nachttemperatuur (DIF). Planten strekken minder bij een negatieve DIF.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras

Orange Shades

Red Shades


Violet Shades


White

Yellow Shades

Mixture

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road,West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2024 Ball Horticultural Company