

## Petunia Mirage F<sub>1</sub> Serie

(*Petunia x hybrida*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 14-01-21)

### Algemene informatie

| Blootstelling | Bloeiperiode                            | Hoogte                  | Breedte                 | Plantafstand            |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zon           | Voorjaar, Late voorjaar, Zomer, Nazomer | 10-15 in.<br>(25-38 cm) | 10-12 in.<br>(25-30 cm) | 10-14 in.<br>(25-36 cm) |

### Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Aantal dagen van 50% tot maximale kieming | pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| PEL, RAW        | 288                 | 1          | 4-5                          | 3-5                                       | 5,5-5,8 pH<br>0,75-1,0 mmhos/cm    | Nee                   |

### Pluggenteelt

|                       | Ontwikkelingsstadium 1 | Ontwikkelingsstadium 2                    | Ontwikkelingsstadium 3                  | Ontwikkelingsstadium 4                  |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vochtigheid substraat | Niveau 4-5             | Niveau 3-4                                | Niveau 2-4                              | Niveau 2-4                              |
| Temperatuur           | 72-76°F<br>(22-24°C)   | 68-75°F<br>(20-24°C)                      | 65-70°F<br>(18-21°C)                    | 62-65°F<br>(17-18°C)                    |
| Licht                 | Licht                  | 1.000-2.500 f.c.<br>(10.800-26.900 Lux)   | 2.500-4.000 f.c.<br>(26.900-43.100 Lux) | 2.500-5.000 f.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| Bemesten              |                        | Minder dan 100 ml N<br>(EC lager dan 0,7) | 100 tot 175 ml N<br>(EC 0,7 tot 1,2)    | 100 tot 175 ml N<br>(EC 0,7 tot 1,2)    |
| Groeiregulatoren      |                        |                                           | daminozide/2.500-5.000 ppm/Spuiten      | daminozide/2.500-5.000 ppm/Spuiten      |

### Teelt tot eindproduct

| Teelttemperatuur                                     | pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat | Bemesten                             | Daglengte             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| (dag) 62-70°F (17-21°C)<br>(nacht) 55-65°F (13-18°C) | 5,5-6,2 pH<br>1,0-1,5 mmhos/cm      | 100 tot 175 ml N<br>(EC 0,7 tot 1,2) | Facultatieve langedag |

### Teeltplanning

| Potmaat / Containermaat    | Planten per pot | Teeltduur   | Seizoen  | Groeiregulatoren                   |
|----------------------------|-----------------|-------------|----------|------------------------------------|
| Multiplaat/Tray (Cup Pack) | 1 (ppp)         | 5-6 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten |
| 10" Pot of HB/3 Gallon     | 3 (ppp)         | 5-7 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten |

### Ziekten en plagen

Insecten: Trips, bladluizen, rouwmuggen, oevervliegen Ziekten en plagen: Botrytis, Rhizoctonia, Pythium

**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras



Blue



Blue Star




Blue Vein



Burgundy Star



Chic




Deep Rose



Lavender



Light Blue



Lilac



Mid-Blue



Pink




Plum




Plum Crystal




Purple




Red



Red Morn



Red Picotee




Rose




Rose Morn




Rose Star




Salmon




Spring



Sugar




Summer



Velvet



White



Yellow



Reflections  
Mixture



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2024 Ball Horticultural Company