

## Vinca Mediterranean XP Serie

(*Catharanthus roseus*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 02-11-23)

### Algemene informatie

| Blootstelling | Bloeiperiode                  | Hoogte                | Breedte                 | Plantafstand     |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Zon           | Late voorjaar, Zomer, Nazomer | 4-6 in.<br>(10-15 cm) | 20-30 in.<br>(51-76 cm) | 8 in.<br>(20 cm) |

### Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Aantal dagen van 50% tot maximale kieming | pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| RAW             | 288                 | 1          | 5                            | 3-5                                       | 5,8-6,0 pH<br>0,75 mmhos/cm        | Ja                    |

### Pluggenteelt

|                              | Ontwikkelingsstadium 1 | Ontwikkelingsstadium 2                    | Ontwikkelingsstadium 3               | Ontwikkelingsstadium 4               |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Vochtigheid substraat</b> | Niveau 4               | Niveau 3-4                                | Niveau 2-4                           | Niveau 2-4                           |
| <b>Temperatuur</b>           | 75-78°F<br>(24-26°C)   | 70-72°F<br>(21-22°C)                      | 70-72°F<br>(21-22°C)                 | 70-72°F<br>(21-22°C)                 |
| <b>Licht</b>                 | Optioneel              | 2.500 f.c.<br>(26.900 Lux)                | 2.500 f.c.<br>(26.900 Lux)           | 5.000 f.c.<br>(53.800 Lux)           |
| <b>Bemesten</b>              |                        | Minder dan 100 ml N<br>(EC lager dan 0,7) | 100 tot 175 ml N<br>(EC 0,7 tot 1,2) | 100 tot 175 ml N<br>(EC 0,7 tot 1,2) |
| <b>Groeiregulatoren</b>      |                        |                                           | ancymidol/2-5 ppm/Spuiten            | ancymidol/2-5 ppm/Spuiten            |

### Belangrijke tips voor vermeerdering

Warmte van onderaf verhoogt het aantal bruikbare planten en verkort de teeltduur. Preventief spuiten in fase 3 en 4 tegen Thielaviopsis, Pythium, Phytophthora en Rhizoctonia is wordt aanbevolen. De aanbevelingen over groeiregulatie zijn slechts informatief en zijn niet op alle groeiomstandigheden en regio's van toepassing. Beoordeel voor gebruik eerst uw teelt.

### Teelt tot eindproduct

| Teelttemperatuur                               | pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat | Bemesten                             | Daglengte         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| (dag) 75°F (24°C)<br>(nacht) 65-68°F (18-20°C) | 5,5-6,0 pH<br>1,5-2,0 mmhos/cm      | 225 tot 300 ml N<br>(EC 1,5 tot 2,0) | Daglengteneutraal |

### Teeltplanning

| Potmaat / Containermaat | Planten per pot | Teeltduur     | Seizoen  | Groeiregulatoren             |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------|------------------------------|
| 4"/4,5"/Quart           | 1 (ppp)         | 8-9 (weken)   | Voorjaar | daminozide 2.500 ppm Spuiten |
| 10" Pot of HB/3 Gallon  | 7 (ppp)         | 12-14 (weken) | Voorjaar | daminozide 2.500 ppm Spuiten |
| 4"/4,5"/Quart           | 1 (ppp)         | 5-6 (weken)   | Zomer    | daminozide 2.500 ppm Spuiten |
| 10" Pot of HB/3 Gallon  | 7 (ppp)         | 8-10 (weken)  | Zomer    | daminozide 2.500 ppm Spuiten |

### Bemestingsaanbeveling

Start 1 week na het oppotten met wekelijkse bemesting op niveau 4 (225 tot 300 mg/l N; 1,5 tot 2,0 mS/cm). Maak daarbij vooral gebruik van stikstofmeststoffen met een laag fosforgehalte. Handhaaf in het substraat een EC van 1,5 tot 2,0 mS/cm en een pH van 5,8. Bij een vast bemestingsprogramma kan meststof op niveau 3 (175 tot 225 mg/l N; 1,2 tot 1,5 mS/cm EC) worden toegepast bij handhaving van de hiervoor genoemde aanbevolen EC- en pH-waarden.

## Gevoeligheid voor gewasbeschermingsmiddelen

Er is fytotoxiciteit gemeld bij *Catharanthus roseus* (Vinca) na toepassing van paclobutrazol (Bonzi), uniconazool (Sumagic) en flurprimidol (Topflor).

## Ziekten en plagen


Insecten: Spintmijten, trips, bladluizen, wolluizen. Ziekten en plagen: Rhizoctonia, Botrytis, Phytophthora, Rhizopus, Pythium, Thielaviopsis, Alternaria, Ulocladium, tomatenbronsvlekkenvirus

## Belangrijke tips voor teelt eindproduct


Aangietbehandeling met een fungicide na oppotten. Houd de hoeveelheid licht zo hoog mogelijk ( $DLI = 12 \text{ mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ ) bij handhaving van de aanbevolen temperatuur. Handhaaf een gelijkmatige vochtigheidsgraad in het substraat. Voorkom een teveel aan water en houd ook het blad droog, om aantastingen tegen te gaan. Groeiregulatie is eventueel niet nodig voor deze serie. Een negatieve DIF kan worden ingezet bij het in de hand houden van de lengtegroei. Daminozide en ancymidol kunnen desgewenst worden ingezet bij het tegengaan van strekken.

**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras



Burgundy Halo



Dark Red



Hot Rose



Peach



Red



Rose Halo



Strawberry



White



Mixture



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2024 Ball Horticultural Company