GrowerFacts

PanAmerican Seed®

Viola Sorbet® XP F_1 Serie

(Viola cornuta)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 27-10-23)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Half schaduw, Zon	Vroege voorjaar, Voorjaar, Late voorjaar, Nazomer, Najaar, Winter	6-8 in. (15-20 cm)	6-8 in. (15-20 cm)	6 in. (15 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Aantal dagen van 50% tot maximale kieming	pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PRM, RAW	288	1	5	3-4	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Ja

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3-4	Niveau 2-4
Temperatuur	65-70°F (18-21°C)	60-70°F (16-21°C)	60-65°F (16-18°C)	55-60°F (13-16°C)
Licht	Optioneel	2.500 f.c. (26.900 Lux)	2.500 f.c. (26.900 Lux)	5.000 f.c. (53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)
Groeiregulatoren			ancymidol/5-10 ppm/Spuiten daminozide/1.500-2.500 ppm/Spuiten	ancymidol/5-10 ppm/Spuiten daminozide/1.500-2.500 ppm/Spuiten

Belangrijke tips voor vermeerdering

Pas tijdens ontwikkelingsstadium 3 en 4 groeiregulatoren toe in een dosering en met een frequentie die worden afgestemd op de omstandigheden ter plekke.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 60°F (16°C) **(nacht)** 50-55°F (10-13°C)	5,5-5,8 pH 1,5 mmhos/cm	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	Facultatieve langedag

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
Multiplaat/Tray (Cup Pack)	1 (ppp)	5-7 (weken)	Vroege voorjaar	daminozide 1.500-2.500 ppm Spuiten
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	5-7 (weken)	Vroege voorjaar	daminozide 1.500-2.500 ppm Spuiten
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	5-7 (weken)	Vroege voorjaar	daminozide 1.500-2.500 ppm Spuiten
Multiplaat/Tray (Cup Pack)	1 (ppp)	3 (weken)	Najaar	daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	4-5 (weken)	Najaar	daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	3-4 (weken)	Najaar	daminozide 2.500-5.000 ppm Spuiten

Bemestingsaanbeveling

Begin bij een bedekte teelt 1 week na het oppotten met een wekelijkse bemesting van 150 mg/l N. Bij een onbedekte teelt kan aanvullende bemesting nodig zijn. Handhaaf vanaf het oppotten tot het einde van de teelt een EC van 1,5 mS/cm en een pH van 5,6 tot 5,8. Wissel af tussen een zure meststof, zoals 20-10-20, en een basische meststof zoals 15-5-15 calcium/magnesium om de pH in balans te houden. Neem als de pH boven de 6,0 uitkomt maatregelen om de pH naar het gewenste niveau omlaag te brengen.

Ziekten en plagen

Ziekten en plagen: Omvalziekte en problemen met uitval en aantastingen als Thielaviopsis basicola, bladvlekkenziekte en Botrytis komen algemeen voor. Insecten: Rouwmuggen en oevervliegen kunnen een probleem vormen tijdens de pluggenteelt. Bladluizen, trips, mijten en witte vliegen kunnen problemen veroorzaken tijdens de afrondende fase van de teelt.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Pas groeiregulatoren toe in een dosering en met een frequentie die worden afgestemd op de omstandigheden ter plekke.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras

Beaconsfield

Blue Blotch

Deep Orange

Delft Blue

Denim Jump Up

Lemon Ice Blotch

Lemon Jump Up

Marina

Morpho

Neptune

Orange Jump Up Improved

Pink Halo

Pink Wing

Purple

Purple Face

Raspberry

Red

Rose Blotch

True Blue

White

White Blotch Improved

White Jump Up

Yellow

Yellow Blotch

Yellow Burgundy Jump Up

Yellow Jump Up

Yellow Pink Jump Up

YTT

Autumn Select Mixture

Blueberry Sundae Mixture

Citrus Mixture

Harvest Mixture

Jump Up Mixture

Mixture

Spring Select Mixture

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road,West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2024 Ball Horticultural Company