

Calibrachoa Kabloom™ F₁ Serie

(*Calibrachoa x hybrida*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 24-02-20)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Vroege voorjaar, Voorjaar, Late voorjaar, Zomer, Nazomer	8-12 in. (20-30 cm)	10-14 in. (25-36 cm)	8-12 in. (20-30 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PMPL	288	1	5-6	5-7	5,5-5,8 pH	Optioneel
	128	1	7-8		0,75 mmhos/cm	

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 5	Niveau 4	Niveau 2-4	Niveau 2-4
Temperatuur	72-75°F (22-24°C)	68-70°F (20-21°C)	64-68°F (18-20°C)	55-64°F (13-18°C)
Licht	Optioneel	10-12 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	10-15 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	10-20 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Bemesten		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7
Groeiregulatoren		daminozide/2.000-2.500 ppm/Spuiten paclobutrazol/2-3 ppm/Spuiten	daminozide/2.000-2.500 ppm/Spuiten paclobutrazol/2-3 ppm/Spuiten	daminozide/2.000-2.500 ppm/Spuiten paclobutrazol/2-3 ppm/Spuiten

Belangrijke tips voor vermeerdering

Toppen of terugsnoeien wordt aanbevolen bij kleinere potten en bij lage DLI-waarden. Laat bij het toppen minstens 4 internodiën ongemoeid.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 64-75°F (18-24°C)	5,5-5,8 pH	225 tot 300 ml N - EC 1,5 tot 2,0	Obligat (kwalitative) langedag
(nacht) 55-64°F (13-18°C)	1,5-2,0 mmhos/cm		

Aanbevolen daglengte

10 uur bij Kabloom Yellow; 10,5 uur bij Kabloom White Improved, Kabloom Orange en Kabloom Blue; 11 uur bij Kabloom Denim, Kabloom Pink, Kabloom Cherry en Kabloom Coral; 11,5 uur Kabloom Light Pink Blast. Zorg voor een DLI van 10 tot 25 mol·m⁻²·d⁻¹.

Teeltplanning


Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	7-8 (weken)	Voorjaar	flurprimidol 1-2 ppm Aangietbehandeling
4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	7-8 (weken)	Voorjaar	paclobutrazol 1-3 ppm Aangietbehandeling
10" Pot of HB/3 Gallon	3 (ppp)	9-11 (weken)	Voorjaar	flurprimidol 2-3 ppm Aangietbehandeling
10" Pot of HB/3 Gallon	3 (ppp)	9-11 (weken)	Voorjaar	paclobutrazol 2-3 ppm Aangietbehandeling
10" Pot of HB/3 Gallon	3 (ppp)	5-6 (weken)	Zomer	flurprimidol 2-3 ppm Aangietbehandeling
10" Pot of HB/3 Gallon	3 (ppp)	5-6 (weken)	Zomer	paclobutrazol 2-3 ppm Aangietbehandeling

Bemestingsaanbeveling


Calibrachoa stelt hoge eisen aan de voeding. Dien zo nodig ijzer toe.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.


Foto's ras



Blue



Cherry




Coral




Denim




Light Pink Blast




Orange



Pink



White



Yellow

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company