

## Ornamental Oregano Kirigami

(*Origanum x hybrida*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 26-01-21)

### Algemene informatie

| Blootstelling | Bloeiperiode         | Hoogte                 | Breedte                 | Plantafstand            |
|---------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zon           | Late voorjaar, Zomer | 8-10 in.<br>(20-25 cm) | 12-14 in.<br>(30-36 cm) | 14-18 in.<br>(36-46 cm) |

### Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Aantal dagen van 50% tot maximale kieming | pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| RAW             | 288                 | 4          | 5-6                          | 4-5                                       | 5,8-6,5 pH<br>0,75 mmhos/cm        | Nee                   |

### Pluggenteelt

|                              | Ontwikkelingsstadium 1 | Ontwikkelingsstadium 2                    | Ontwikkelingsstadium 3                  | Ontwikkelingsstadium 4                  |
|------------------------------|------------------------|---|---|---|
| <b>Vochtigheid substraat</b> | Niveau 4               | Niveau 3                                  | Niveau 3-2                              | Niveau 2                                |
| <b>Temperatuur</b>           | 68-72°F<br>(20-22°C)   | 65-68°F<br>(18-20°C)                      | 65-68°F<br>(18-20°C)                    | 60-65°F<br>(16-18°C)                    |
| <b>Licht</b>                 | Licht                  | 2.000-2.500 f.c.<br>(21.500-26.900 Lux)   | 2.000-2.500 f.c.<br>(21.500-26.900 Lux) | 3.500-5.000 f.c.<br>(37.700-53.800 Lux) |
| <b>Bemesten</b>              |                        | Minder dan 100 ml N<br>(EC lager dan 0,7) | 100 tot 175 ml N<br>(EC 0,7 tot 1,2)    | 100 tot 175 ml N<br>(EC 0,7 tot 1,2)    |
| <b>Groeiregulatoren</b>      |                        |   | daminozide/1.000-1.500 ppm/Spuiten      | daminozide/1.000-1.500 ppm/Spuiten      |

### Belangrijke tips voor vermeerdering

Plant de pluggen niet te diep, op hetzelfde niveau als het substraat. Voorzie in een actief groeiklimaat. Voorkom het telen bij te vochtige omstandigheden. Teel aan de droge kant.

### Teelt tot eindproduct

| Teelttemperatuur   | pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat | Bemesten                             | Daglengte                      |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>(dag)</b> 65-68°F (18-20°C)<br><b>(nacht)</b> 60-65°F (16-18°C) | 5,8-6,5 pH<br>1,2-1,5 mmhos/cm      | 175 tot 225 ml N<br>(EC 1,2 tot 1,5) | Obligat (kwalitative) langedag |

### Aanbevolen daglengte

Lange dag vereist. De kritische daglengte is 14 uur.

## Teeltplanning

| Potmaat / Containermaat | Planten per pot | Teeltduur     | Seizoen       | Groeiregulatoren                   |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 4"/4.5"/Quart           | 1 (ppp)         | 10-12 (weken) | Late voorjaar | daminozide 1.500-2.000 ppm Spuiten |
| 5"/6"/1 Gallon          | 1 (ppp)         | 11-13 (weken) | Late voorjaar | daminozide 1.500-2.000 ppm Spuiten |
| 10" Pot of HB/3 Gallon  | 3-5 (ppp)       | 12-13 (weken) | Late voorjaar | daminozide 1.500-2.000 ppm Spuiten |
| 4"/4.5"/Quart           | 1 (ppp)         | 9-10 (weken)  | Zomer         | daminozide 1.500-2.000 ppm Spuiten |
| 5"/6"/1 Gallon          | 1 (ppp)         | 9-11 (weken)  | Zomer         | daminozide 1.500-2.500 ppm Spuiten |
| 10" Pot of HB/3 Gallon  | 3-5 (ppp)       | 10-12 (weken) | Zomer         | daminozide 2.000-2.500 ppm Spuiten |

## Ziekten en plagen

Gevoelig voor Botrytis, stengelrot en hartrot, vooral bij vochtige buitenlucht of te vochtige teeltomstandigheden. Kies voor een bedekte teelt indien de productieomstandigheden buiten niet relatief droog zijn.

## Belangrijke tips voor teelt eindproduct


Plant heeft een actief groeiklimaat nodig. Teel aan de droge kant met een hogere lichtintensiteit. Meest geschikt voor bedekte teelten, indien het frequent regent. Bemest licht tot matig en irrigeer matig. Laat het goed doorlatende substraat enigszins opdrogen, voordat opnieuw water wordt gegeven. Verdraagt geen vochtige groeiomstandigheden. Die leiden tot rot in de steel en de wortels. De bracteeën worden veel intenser diep paars wanneer de planten veel licht krijgen (12 tot 15 mol·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>) en koel worden geteeld (onder de 50°F/10°C). Produceert u onder droge klimaatomstandigheden, teel dan buiten. Dan worden de bracteeën het diepst paars. Kirigami reageert goed op daminozide. Bij voorkeur meerdere malen toepassen in lage doseringen om een gedrongen groei van de planten te voorkomen. Pas geen daminozide meer toe wanneer de bracteeën beginnen te kleuren; dit om verbleking te voorkomen. Gezien de breedheid van toepassingen kan geen vast aantal behandelingen met groeiregulatoren worden aanbevolen. Kirigami laat zich gemakkelijk aan het door u gewenste eindresultaat aanpassen en leent zich voor tal van potmaten.

**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.


## Foto's ras



Kirigami



Kirigami



Kirigami

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2021 Ball Horticultural Company