

Anemone Mona Lisa® F₁ Serie

(*Anemone coronaria*)

Teelt van snijbloemen (herzien/aangepast 24-02-19)

Algemene informatie

| Blootstelling | Bloeiperiode | Hoogte | Breedte | Plantafstand |
|---------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Half schaduw | Vroege voorjaar, Najaar | 18 in. (46 cm) | 6 in. (15 cm) | 6-8 in. (15-20 cm) |

Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Het aantal dagen tot de kieming | pH- en EC-waarden zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| RAW | 288 | 1 | 7-8 | 10-14 | 5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm | Ja |

Pluggenteelt

| | Ontwikkelingsstadium 1 | Ontwikkelingsstadium 2 | Ontwikkelingsstadium 3 | Ontwikkelingsstadium 4 |
|------------------------------|------------------------|---|---|---|
| Vochtigheid substraat | Niveau 4 | Niveau 3-4 | Niveau 3-4 | Niveau 3 |
| Temperatuur | 65-70°F (18-21°C) | 65-70°F (18-21°C) | 60-65°F (16-18°C) | 60°F (16°C) |
| Licht | | 1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux) |
| Bemesten | | Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7 | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2 | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2 |

Bemestingsaanbeveling

Geef de zaailingen vanaf het begin van Fase 2 tweemaal per week een stikstofbemesting; de ene keer 14-0-14, de andere keer 20-10-20.

Belangrijke tips voor vermeerdering

Aangezien anemoon een langzame groeier is, is het voor het telen van een gezonde plug belangrijk om de groeiomstandigheden (vochtigheid, temperatuur, bemesting en insectenbestrijding) optimaal te houden.

Teelt tot eindproduct

| Teelttemperatuur | pH- en EC-waarden teeltsubstraat | Bemesten | Daglengte |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Voor de bloemzetting: (dag) 60-65°F (16-18°C) (nacht) 55°F (13°C) | 5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm | 225 tot 300 ml N - EC 1,5 tot 2,0 | Daglengte neutraal |

Teeltplanning

| Type gewas | Seizoen | Dichtheid | Teeltduur |
|------------|----------|---|-------------|
| - | Voorjaar | 2-4 planten per ft ² (22-43 planten per m ²) | 12-14 weken |

Bemestingsaanbeveling

Begin wanneer de pluggen eenmaal zijn beworteld, met een wekelijkse bemesting van 200 mg/l N met een 15-5-15 Cal-Mag meststof. Wissel af met een calciumnitraat bemesting bij een dosering van 200 ml/l

Ziekten en plagen

OPMERKING: De wortels van de anemoon zijn van nature donkerbruin. Houd daar rekening mee bij de controle op wortelrotsymptomen.
Insecten: Luizen, trips, witte vlieg. Ziekten en plagen: Botrytis, Phytophthora en wortelrot komen bij de anemoon regelmatig voor.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

De optimale steellengte kan worden bereikt door een langedagbehandeling en door de temperatuur tijdens de teelt relatief laag te houden (12 tot 14 °C). OPMERKING: Telen in 10 cm potten. Gebruik 10 cm potten voor de teelt als potplant of als perkplant; groeiregulering is nodig. Pas bij het watergeven paclobutrazol (Bonzi) toe in een concentratie van 2 ml/l, 5 tot 6 weken na het oppotten in 10 cm potten. Er kan met één paclobutrazol-behandeling worden volstaan. Paclobutrazol kan tot 4 ml/l bij het watergeven succesvol worden toegepast. Wees ervan verzekerd dat het wortelgestel voor het watergeven met paclobutrazol goed is ontwikkeld; de wortels moeten de pot vullen.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffende middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Deep Blue
Improved



Orchid Shades
Improved



Pink




Red Bicolor



Scarlet Eye



White



Wine White
Bicolor



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company