

Carthamus Grenade Serie

(*Carthamus tinctorius*)

Teelt van snijbloemen (herzien/aangepast 26-02-19)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Zomer	32-40 in. (81-102 cm)	8-10 in. (20-25 cm)	6-10 in. (15-25 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
COT	Rechtstreeks zaaien		N/A			

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat				
Temperatuur	54-60°F (12-16°C)			
Licht				
Bemesten	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7			

Belangrijke tips voor vermeerdering

Rechtstreeks zaaien is aanbevolen. De afstand tussen de rijen dient 12 in. (30 cm) te zijn. Dun de zaailingen uit tot een onderlinge afstand van 2,5 in. (6 cm). *Carthamus* vormt een penwortel, dus als er eerst in een tray wordt gezaaid, dienen de zaailingen 5 tot 7 dagen na het zaaien te worden opgepot.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 70-75°F (21-24°C) (nacht) 50-55°F (10-13°C)		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	-

Teeltplanning

Type gewas	Seizoen	Dichtheid	Teeltduur
Vollegrondsteelt	Zomer	-	14 weken

Bemestingsaanbeveling

Een bovengemiddelde vruchtbaarheid van de bodem bevordert een overdadige vegetatieve groei en doet de productie van bloemen dalen.

Ziekten en plagen

bladluizen, Botrytis, Colletotrichum carthamii. Er wordt een preventieve behandeling tegen schimmels aanbevolen.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Bij zaaien in het voorjaar kan in Noord-Europa van juli tot in september worden gesneden.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Orange

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company