

Delphinium Blue Donna

(*Delphinium x belladonna*)

Teelt van snijbloemen (herzien/aangepast 10-01-18)

Plug crop time: 5 to 6 weeks

Transplant to finish: 12 to 16 weeks

- True blue Delphinium has improved uniformity and colour, increased productivity and more stems per sq. ft./sq. m.

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Late voorjaar, Zomer, Nazomer	32-40 in. (81-102 cm)	8-10 in. (20-25 cm)	

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	288	1	6-8	7-10	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Ja

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 2-3	Niveau 2
Temperatuur	68-72°F 20-22°C	65-68°F 18-20°C	65-68°F 18-20°C	60-65°F 16-18°C
Licht	Optioneel	2.000-2.500 f.c. (21.500-26.900 Lux)	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2.000-2.500 f.c. (21.500-26.900 Lux)	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 4.000-5.000 f.c. (43.100-53.800 Lux)
Bemesten	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengthe
Najaar: (dag) 63-68°F17-20°C (nacht) 53-58°F12-14°C Voorjaar: (dag) 65-68°F18-20°C (nacht) 53-58°F12-14°C Zomer: (dag) 65-68°F18-20°C (nacht) 53-58°F12-14°C	5,8-6,5 pH 1,0-1,3 mmhos/cm	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	Facultatieve langedag

Teeltplanning

Type gewas	Seizoen	Dichtheid	Teeltduur
------------	---------	-----------	-----------

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Plantdichtheid: Bij een teelt als eenjarig gewas in de kas = 12 tot 16 planten/m². Bij een teelt als eenjarig gewas in de vollegrond = 16 tot 18 planten/m². Bij een teelt als vaste plant in de vollegrond = 9 planten/m². Top de planten niet. Bemest regelmatig met een uitgebalanceerde mengmeststof. Vermijd een N:K-ratio hoger dan 2. Irrigatie: geef water over het gewas in de eerste 4 tot 6 weken. Ga daarna over op druppelbevloeiing. De planten hebben gemiddeld tot veel water nodig. Houd het gewas echter droog en handhaaf een lage relatieve luchtvochtigheid (RV). Bij voorkeur veel licht. Snijd de stelen af op een hoogte van 6 in. (15 cm) boven de grond om wortelrot te voorkomen. Snij wanneer 25 tot 30% van de bloemen open zijn. Teeltcyclus voor een eenjarige gewas: bij vroeg uitplanten (in januari/februari) volgt de eerste oogst na 12 tot 15 weken, de daaropvolgende oogst 5 tot 6 weken later en eventueel een derde oogst opnieuw 5 tot 6 weken later. Stelen met de beste kwaliteit kunnen worden gesneden tijdens de tweede en derde oogst.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler kennis te nemen van de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld en deze strikt na te leven. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Blue Donna



Blue Donna

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company