

## Snapdragon Rocket F<sub>1</sub> Serie

(*Antirrhinum majus*)

Teelt van snijbloemen (herzien/aangepast 24-10-19)

### Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Vroege voorjaar, Voorjaar, Najaar	30-36 in. (76-91 cm)	16-18 in. (41-46 cm)	14-18 in. (36-46 cm)

### Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	406	1	5-6	4-8	5,5-6,0 pH 0,75 mmhos/cm	Lichte afdekking

### Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
<b>Vochtigheid substraat</b>	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 3-4	Niveau 3
<b>Temperatuur</b>	65-68°F (18-20°C)			
<b>Licht</b>		2.500 f.c. (26.900 Lux)	2.500 f.c. (26.900 Lux)	5.000 f.c. (53.800 Lux)
<b>Bemesten</b>		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

### Belangrijke tips voor vermeerdering

Bronze, Golden, Pink, Red en Rose Shades kiemen het beste bij licht. Voorkom hoge pH-waarden (>6,5) in het substraat, omdat hierdoor een ijzer- en boortekort kunnen ontstaan. Boortekort, een hoog EC en ophoping van vocht rond de groeipunt kunnen samen met een slechte luchtcirculatie leiden tot topsterfte bij zaailingen. Zorg tijdens de teelt voor een preventieve bestrijding met fungiciden tegen valse meeldauw.

### Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
<b>Voor de bloemzetting:</b> (dag) 65-80°F (18-27°C) (nacht) 55-60°F (13-16°C)	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	175 tot 225 ml N - EC 1,2 tot 1,5	-

### Teeltplanning

Type gewas	Seizoen	Dichtheid	Teeltduur
-	Voorjaar	3-4 planten per ft <sup>2</sup> (32-43 planten per m <sup>2</sup> )	13-16 weken

### Bemestingsaanbeveling

Fosfor en calcium worden over het algemeen voorafgaand aan het uitplanten door de grond gewerkt. Andere meststoffen worden tijdens de teelt toegediend in vloeibare vorm. Superfosfaat in een dosering van 5 pounds/100 ft.<sup>2</sup> (2 g/m<sup>2</sup>) door de grond gewerkt moet in principe voldoende zijn voor de fosfaatvoorziening. Als uit bodemonsters blijkt dat het calciumgehalte laag is, voeg dan bij een lage pH kalksteen toe, of bij een normale pH gips; beide in een dosering van 5 pounds/100 ft.<sup>2</sup> (250 g/m<sup>2</sup>). Irrigeer met schoon water na het uitplanten. Begin bij de tweede keer watergeven met bemesten. Pas een meststof toe met een laag ammoniumgehalte bij 150 tot 200 mg/l. Bemest continu en spoel af en toe door met schoon water. Een overmaat aan vocht en hoge bemestingsniveaus zorgen voor veel zijscheuten.

## Ziekten en plagen

Insecten: bladluizen, trips Ziekten en plagen: valse meeldauw, Botrytis, roest, echte meeldauw Overig: Hoge pH-waarden in de grond en ijzer- en boortekorten zorgen voor veel zijscheuten.

## Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Deze breed toepasbare leeuwenbekserie leent zich zowel voor de tuinaanleg als voor de snijbloemeteelt. Rocket staat voor een leeuwenbek van hoge kwaliteit in groep 3,4 van voorjaars- en zomerbloeiende rassen voor de tuinaanleg. Groep 3: Nachttemperatuur: 55 tot 60°F (13 tot 16°C), dagtemperatuur: 60 tot 65°F (16 tot 18°C). 25.000 tot 45.000 lux. Groep 4: Nachttemperatuur: >60°F (>16°C) Dagtemperatuur: >65°F (>18°C). 30.000 tot 50.000 lux.


**OPMERKING:** Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

## Foto's ras

---



Bronze



Cherry



Golden




Lemon



Orchid



Pink



Red



Rose Shades



White



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.  
©2020 Ball Horticultural Company