

Arabis Spring Charm

(*Arabis blepharophylla*)

Teelt van vaste planten (herzien/aangepast 28-10-19)

Algemene informatie

| Blootstelling | Bloeiperiode | Hoogte | Breedte | Plantafstand |
|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Half schaduw | Voorjaar, Late voorjaar | 6-8 in. (15-20 cm) | 8 in. (20 cm) | 18-24 in. (46-61 cm) |

Kieming

| Zaadproductvorm | Aanbevolen plugmaat | Zaden/plug | Duur pluggenteelt (in weken) | Het aantal dagen tot de kieming | pH- en EC-waarden zaaisubstraat | Afdekken van het zaad |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| RAW | 288 | 4 | 6-8 | 3-6 | 5,5-6,5 pH 0,75 mmhos/cm | Nee |

Pluggenteelt

| | Ontwikkelingsstadium 1 | Ontwikkelingsstadium 2 | Ontwikkelingsstadium 3 | Ontwikkelingsstadium 4 |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vochtigheid substraat | Niveau 4 | Niveau 3-4 | Niveau 2-3 | Niveau 2 |
| Temperatuur | 68-72°F (20-22°C) | 65-68°F (18-20°C) | 65-68°F (18-20°C) | 60-65°F (16-18°C) |
| Licht | Optioneel | 2.500 f.c. (26.900 Lux) | 2.500 f.c. (26.900 Lux) | 5.000 f.c. (53.800 Lux) |

Bemesten

Vernalisatie / Koelperiode

Ja - duur 8 tot 10 weken van het moment dat zich minimaal 7 tot 8 echte bladeren hebben gevormd.

Juvenile stadium

Begin met de koudebehandeling vanaf het moment dat zich minimaal 7 tot 8 echte bladeren hebben gevormd.

Teelt tot eindproduct

| Teelttemperatuur | pH- en EC-waarden teeltsubstraat | Bemesten | Daglengte |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (dag) 60-65°F (16-18°C) (nacht) 50-54°F (10-12°C) | 5,5-6,5 pH 1,0-1,3 mmhos/cm | 100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2 | Daglengteneutraal |

Teeltplanning

| Type gewas | Potmaat / Containermaat | Planten per pot | Teeltduur | Seizoen | Groeieregulatoren |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Overwintering | 5"/6"/1 Gallon | 1 (ppp) | 28-34 (weken) | Vroege voorjaar | - |

Ziekten en plagen

Controleer regelmatig op echte meeldauw, sclerotienrot, bladluizen, bladmineerders, rouwmuggen en spint.

Teeltmaatregelen voor meer bossige (vertakte) planten

Laat de zaailingen volume maken tot het stadium van 7 tot 8 echte bladeren.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Goed doorlatende grond. Houdt niet van vocht tijdens de winter. Bemest met mate.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Spring Charm



Spring Charm

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company