

Aurinia Gold Rush

(*Aurinia saxatilis*)

Teelt van vaste planten (herzien/aangepast 24-02-20)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Vroege voorjaar, Voorjaar	5-8 in. (13-20 cm)	5-8 in. (13-20 cm)	10-12 in. (25-30 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	288	4	6-7	3-5	5,5-6,4 pH 1,1-1,3 mmhos/cm	Nee

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2-3	Niveau 2
Temperatuur	65-72°F (18-22°C)	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
Licht	Optioneel	2.500 f.c. (26.900 Lux)	2.500 f.c. (26.900 Lux)	5.000 f.c. (53.800 Lux)
Bemesten	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

Vernalisatie / Koelperiode

Ja - Heeft vanaf het stadium met 10 echte bladeren 6 tot 8 weken een gemiddelde dagtemperatuur (ADT) nodig van 50°F (10 °C).

Juvenile stadium

Voor het stadium van 8 tot 10 echte bladeren

Belangrijke tips voor vermeerdering

Aurinia is een rotsplant. Zorg voor een goede ontwatering en een actief teeltklimaat met veel licht.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 60-65°F (16-18°C) (nacht) 50-54°F (10-12°C)	5,5-6,4 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	Daglengteneutraal

Aanbevolen daglengte

Daglengteneutraal

Teeltplanning

Type gewas	Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
Overwintering	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	26-32 (weken)	Vroege voorjaar, Gemiddelde dagtemperatuur 60°F (16°C)	-

Bemestingsaanbeveling

Bemest met mate.

Ziekten en plagen

Te natte teelt; toepassen van verkeerd substraat dat onvoldoende doorlatend is; luizen; valse meeldauw

Teeltmaatregelen voor meer bossige (vertakte) planten

Heeft voorafgaand aan de vernalisatie 10 echte bladeren nodig (6 tot 8 weken een gemiddelde dagtemperatuur (ADT) van 50 °F/10 °C)

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Een goed doorlatende substraat is vereist. Voorkom 's winters overmatige nattigheid. Plant de plugplanten niet te diep (de wortelhals ligt op een lijn met de hoogte van het substraat).

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Gold Rush



Gold Rush

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2020 Ball Horticultural Company