

Campanula Rapido F₁ Serie

(*Campanula carpatica*)

Teelt van vaste planten (herzien/aangepast 06-03-19)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Half schaduw, Zon	Voorjaar, Late voorjaar, Zomer	5-7 in. (13-18 cm)	5-8 in. (13-20 cm)	12-14 in. (30-36 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PEL	288 128*	4 4	7-10 12-13	7-9	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

* Aanbevolen plugmaat voor in bloei trekken

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4-5	Niveau 3-4	Niveau 3	Niveau 2
Temperatuur	65-72°F (18-22°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)
Licht	Optioneel	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Bemesten	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

Vernalisatie / Koelperiode

Nee

Belangrijke tips voor vermeerdering

Voorkom vroeg in de pluggenteelt een te hoge EC-waarde, houd deze op maximaal 0,5 in ontwikkelingsstadium 1 en 2. Teel bij een daglengte van minder dan 13 uur om de planten in een vegetatief stadium te houden. Spuit met een fungicide tegen de omvalziekte bij zaailingen. Informatie over het forceren. Zie de Perennials Forcing Guide (gids voor het forceren van vaste planten)

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 65-68°F (18-20°C)	5,6-6,2 pH	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	Obligat (kwalitative) langedag
(nacht) 55-60°F (13-16°C)	1,0-1,3 mmhos/cm		

Aanbevolen daglengte

Lange dag van 14 uur of 4 uur nachtonderbreking vereist totdat de knoppen zichtbaar worden.

Teeltplanning

Type gewas	Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeieregulatoren
Eenjarig	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	12-14 (weken)	Late voorjaar	chloormequat chloride 750 ppm Spuiten
Eenjarig	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	12-14 (weken)	Late voorjaar	daminozide 2.000-2.500 ppm Spuiten
Eenjarig	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	9-12 (weken)	Zomer	chloormequat chloride 750 ppm Spuiten
Eenjarig	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	9-12 (weken)	Zomer	daminozide 2.000-2.500 ppm Spuiten
Eenjarig	5"/6"/1 Gallon	3-5 (ppp)	12-14 (weken)	Late voorjaar	chloormequat chloride 750 ppm Spuiten
Eenjarig	5"/6"/1 Gallon	3-5 (ppp)	12-14 (weken)	Late voorjaar	daminozide 2.000-2.500 ppm Spuiten
Eenjarig	5"/6"/1 Gallon	3-5 (ppp)	9-12 (weken)	Zomer	chloormequat chloride 750 ppm Spuiten
Eenjarig	5"/6"/1 Gallon	3-5 (ppp)	9-12 (weken)	Zomer	daminozide 2.000-2.500 ppm Spuiten

Bemestingsaanbeveling

Bemest met mate. Pas een bemesting toe op niveau 2 (100 tot 175 mg/l N).

Ziekten en plagen


Insecten: bladluizen, spintmijten en trips. Ziekten en plagen: Botrytis, Phytophthora en wortelrot veroorzaakt door Pythium of Rhizoctonia. Verlangt gemiddelde irrigatie. Voorkom zowel te natte als te droge teeltomstandigheden.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Vochtig, goed doorlatend substraat. Telen bij te lage temperaturen vertraagd niet alleen de ontwikkeling van de plugplant maar verlengt ook de teelt van het eindproduct. Bij lange zomerdagen ontwikkelen de planten minder volume. Pas dan meer plugplanten per pot/container toe dan in het voorjaar.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Blue

White

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company