

Gaura Sparkle White

(*Gaura lindheimeri*)

Teelt van vaste planten (herzien/aangepast 22-02-19)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Half schaduw, Zon	Voorjaar, Late voorjaar, Zomer, Nazomer	12-24 in. (30-61 cm)	12-20 in. (30-51 cm)	12-15 in. (30-38 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Het aantal dagen tot de kieming	pH- en EC-waarden zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	288	1	5-6	5-6	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Ja

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2	Niveau 2
Temperatuur	65-68°F 18-20°C	66-70°F 19-21°C	65-67°F 18-19°C	59-64°F 15-18°C
Licht	Optioneel	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N - EC lager dan 0,7	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2	100 tot 175 ml N - EC 0,7 tot 1,2

Vernalisatie / Koelperiode

Nee

Belangrijke tips voor vermeerdering

Informatie over het forceren: Zie de Perennials Forcing Guide (gids voor het forceren van vaste planten). Gaura vormt kleine nootjes met 2 tot 3 zaden. Zaai deze bij voorkeur in een tray met grotere gaten.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH- en EC-waarden teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 59-70°F/15-21°C (nacht) 50-64°F/10-18°C	5,5-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm		-

Teeltplanning

Type gewas	Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
Eenjarig	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	7-8 (weken)	Voorjaar	tank mix met daminozide/chloormequat chloride 2,500/750-2,500/1.000 ppm Spuiten
Eenjarig	5"/6"/1 Gallon	1 (ppp)	8-9 (weken)	Voorjaar	tank mix met daminozide/chloormequat chloride 2,500/750-2,500/1.000 ppm Spuiten
Eenjarig	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	8-9 (weken)	Voorjaar	tank mix met daminozide/chloormequat chloride 2,500/750-2,500/1.000 ppm Spuiten

Belangrijke tips voor teelt eindproduct


Goed doorlatende grond. Houdt in de winter niet van natte (verzadigde) grond. Controleer regelmatig op bladluizen. Reken voor een teelt bij 55°F (13°C) met een 4 tot 5 weken langere teeltduur. Zie de Grower Facts (Teelthandleiding) voor nadere informatie over overwinteringsteelten.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Sparkle White



Sparkle White



Sparkle White



Sparkle White



Sparkle White



Sparkle White

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2019 Ball Horticultural Company