

Lavandula Lavance Deep Purple

(*Lavandula angustifolia*)

Teelt van vaste planten (herzien/aangepast 20-01-21)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Zon	Late voorjaar, Zomer, Nazomer	10-12 in. (25-30 cm)	10-12 in. (25-30 cm)	12 in. (30 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Aantal dagen van 50% tot maximale kieming	pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PRM	288 128*	4 6	6-8 8-9	4-5	5,8-6,5 pH 0,7-1,2 mmhos/cm	Ja

* Aanbevolen plugmaat voor in bloei trekken

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 2-3	Niveau 2
Temperatuur	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)
Licht		2.000-2.500 f.c. (21.500-26.900 Lux)	2.500-3.500 f.c. (26.900-37.700 Lux)	4.000-5.000 f.c. (43.100-53.800 Lux)
Bemesten		100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	175 tot 225 ml N (EC 1,2 tot 1,5)	175 tot 225 ml N (EC 1,2 tot 1,5)

Vernalisatie / Koelperiode

Nee

Belangrijke tips voor vermeerdering

Zie voor het forceren de Perennials Forcing Guide (De gids voor het forceren van vaste planten). Zie voor het opstellen van teeltschema's de Lavandula planner. Spuit met een fungicide tegen omvalziekte. Voorzie tijdens de pluggenteelt in een goede ventilatie en luchtwisseling. Teel aan de droge kant en geef 's morgens vroeg water opdat de planten tijdens de dag kunnen opdrogen. Bij gebrek aan luchtwisseling en te weinig voeding kunnen de kiembladeren bij *Lavandula angustifolia* door verstoring van de worteldruk 'zwarte vlekken' vertonen. Dit probleem is omkeerbaar bij meer luchtwisseling en meer voeding.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 60-72°F (16-22°C) (nacht) 60-65°F (16-18°C)	5,8-6,5 pH 1,1-1,4 mmhos/cm	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	Obligat (kwalitative) langedag

Aanbevolen daglengte

Kritische daglengte: 14 uur. Zie de Lavender Scheduling Tool (*Lavandula*-planningsrichtlijn) op panamseed.com voor de teelt tot eindproduct per regio.

Teeltplanning

Type gewas	Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeieregulatoren
Eenjarig	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	9-11 (weken)	Zomer, Gemiddelde dagtemperatuur 65°F (18° C)	daminozide 2.000-3.000 ppm Sputen
Eenjarig	4"/4.5"/Quart	1 (ppp)	10-11 (weken)	Najaar, Gemiddelde dagtemperatuur 65°F (18° C)	daminozide 2.000-3.000 ppm Sputen
Overwintering	4"/4.5"/Quart	1-3 (ppp)	30-38 (weken)	Late voorjaar, Gemiddelde dagtemperatuur 60°F (16°C)	daminozide 2.000-3.000 ppm Sputen
Eenjarig	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	10-12 (weken)	Najaar, Gemiddelde dagtemperatuur 65°F (18° C)	daminozide 2.000-3.000 ppm Sputen
Overwintering	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	30-38 (weken)	Late voorjaar, Gemiddelde dagtemperatuur 60°F (16°C)	daminozide 2.000-3.000 ppm Sputen
Eenjarig	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	10-11 (weken)	Zomer, Gemiddelde dagtemperatuur 65°F (18° C)	daminozide 2.000-3.000 ppm Sputen

Bemestingsaanbeveling

Pas voortdurende bemesting toe op niveau 1 tot 2 (100 tot 125 mg/l N; 0,7 tot 1,2 mS/cm EC of 150 mg/l waar nodig).

Ziekten en plagen

Een actief teelklimaat is gewenst, met een goede doorstroming van de lucht, een lage relatieve luchtvochtigheid (RV) en vrij droge teeltomstandigheden. Uitstekende doorlatendheid van het substraat is een voorwaarde. Echter ook het containerveld dient een goede afvoer te hebben. Is bij een hoge relatieve luchtvochtigheid (RV) en weinig licht vatbaar voor schimmelaantastingen zoals bladvlekkenziekte en Botrytis. Lavandula-planten dienen droog te zijn wanneer deze op transport gaan. Geef niet over het gewas water. Noch tijdens de transportfase, noch op de winkelvloer. Probeer voor een teelt bij langedagomstandigheden in de zomer Lavance Deep Purple. Dit ras maakt beter volume en kleurt sterker tijdens de lange, warme zomerdagen.

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Plant de pluggen niet te diep. Houd de bovenkant van de plug gelijk aan het omringende substraat. Tel bij een lage relatieve luchtvochtigheid (RV) en veel licht. Laat de toplaag van het substraat enigszins drogen tussen het watergeven, maar voorkom dat het vochtigheidsgraad van het substraat medium tot droog wordt, omdat een hoge EC kan leiden tot schade aan de wortels. Controleer regelmatig op Botrytis, wortelrot, bladvlekken, bladluizen en mijten. Houd bij aflevering de planten droog, maar het substraat vochtig. Lavance is het beste voor zomerteelten. Het ras maakt dan het beste volume. Plant niet té vroeg in het seizoen. Koele teeltomstandigheden vertragen de groei. Pas Ellagance Purple toe voor de afzet vroeg in het seizoen als eenjarige in het Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika en Avignon Early Blue in het Zuiden en Noordwesten. Zie de Lavender Scheduling Tool (Lavandula-planningsrichtlijn) op panamseed.com voor de teelt tot eindproduct per regio. Snoei bij overwinteringsteelten alleen het bovenste gedeelte van het blad terug. Doe dat in het midden van het najaar, ongeveer 4 weken voordat de planten in winterrust gaan, of in het voorjaar vlak voordat de planten opnieuw gaan uitlopen.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Lavance Deep
Purple



Lavance Deep
Purple

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2021 Ball Horticultural Company